

30743 N. 10
Beobachtungen

**über Vorliegen und über Vorfall der
Nabelschnur**

in der Königlichen Universitäts-Frauenklinik und Poliklinik
zu Halle a. S. in den Jahren 1890—1901.

~~~~~  
**Inaugural - Dissertation**

zur

**Erlangung der Doctorwürde in der Medizin und Chirurgie,**

welche

mit Genehmigung der hohen medizinischen Fakultät

der

**Vereinigten Friedrichs-Universität  
Halle-Wittenberg**

**Freitag, den 28. November 1902, Mittags 12 Uhr,**

öffentlich vortragen wird

**Max Köhler**

approb. Arzt  
aus Halle a. S.

—————  
Halle a. S.

Hofbuchdruckerei von C. A. Kaemmerer & Co.  
1902.

Gedruckt mit Genehmigung  
der Medizinischen Fakultät der Universität Halle.

Referent: Prof. Dr. Bumm.

**Fraenkel,**  
d. Z. Decan.

Dem Andenken meiner lieben Eltern

gewidmet.



Digitized by the Internet Archive  
in 2026

Unter Nabelschnurvorfall versteht heute wohl die Mehrzahl der Autoren denjenigen Zustand, bei welchem sich die Nabelschnur nach dem Blasensprunge vor dem vorliegenden Kindesteile befindet und zwar entweder noch im Bereich des unteren Uterusabschnittes oder schon in der Vagina oder gar ausserhalb der Vulva. Den Zustand dagegen, bei welchem die Nabelschnur in noch stehender Blase vor dem vorliegenden Teile liegt, nennt man Vorliegen der Nabelschnur. Danach ist also der erfolgte Blasensprung das wesentliche Moment, wodurch sich der Vorfall von dem Vorliegen der Nabelschnur unterscheidet. —

F. v. Winckel allerdings bezeichnet mit Vorliegen der Nabelschnur den Zustand, in welchem sie über dem inneren oder äusseren Muttermund, also noch in der Gebärmutter, gefunden wird. Er nennt die Nabelschnur vorgefallen, sobald sie aus dem Uterus in die Scheide oder vor die Vulva hervorgetreten ist.

Die Angaben über die Häufigkeit des Nabelschnurvorfalles sind sehr verschieden. Nach Hildebrand's aus 45040 Geburtsfällen berechneten Mittelzahl kommt auf 148 Kopflagen ein Vorfall. Zu demselben Resultate gelangt auch Hecker mit einem allerdings aus kleineren Zahlen berechneten Durchschnitt. Nach letzterem kommt ferner bei Beckenendlagen auf 11 und bei Querlagen schon auf 5 Geburten ein Vorfall. Zacharias erhält bei Schädellagen als Verhältniszahl 1 : 143,6.

In der Hallenser Frauenklinik wurden in der Zeit vom 1. April 1890 bis 31. März 1901 vierzig Nabelschnurvorfälle konstatiert und zwar

28 bei Kopflagen,  
8 bei Beckenendlagen,  
4 bei Querlagen.

In dieser Zeit wurden beobachtet

4216 Kopflagen,  
166 Beckenendlagen,  
87 Querlagen.

Es kommt demnach

bei Kopflagen auf 150,6,  
bei Beckenendlagen auf 20,75,  
bei Querlagen auf 21,75

ein Vorfall.

Viel häufiger, nämlich 160 mal, wurde Nabelschnurvorfall in der gleichen Zeit in der Hallenser Poliklinik beobachtet, ein Umstand, der seine Erklärung wohl darin findet, dass die Hilfe der Poliklinik meist nur in Anspruch genommen wird, wenn irgend welche Störungen im Geburtsverlaufe zu erwarten oder bereits eingetreten sind. Von den 160 Fällen von Nabelschnurvorfall wurden

102 bei Kopflagen,  
33 bei Beckenendlagen,  
25 bei Querlagen

konstatiert. Im ganzen wurden in dieser Zeit

2974 Kopflagen,  
695 Beckenendlagen,  
363 Querlagen

von seiten der Poliklinik beobachtet. Es kommt mithin

bei Kopflagen auf 29,15,  
bei Beckendlagen auf 21,06,  
bei Querlagen auf 14,52

ein Vorfall.

Für das Zustandekommen eines Nabelschnurvorfalles kann jeder pathologische Zustand, welcher erschwert oder verhindert, dass das untere Uterinsegment vollständig durch den vorliegenden Kindesteil ausgefüllt wird, das veranlassende Moment abgeben. Der Vorfall der Nabelschnur kommt daher

sehr häufig vor bei fehlerhafter Lage und Einstellung des Fötus. Nach F. v. Winckel findet man bei Nabelschnurvorfall nur 56,9% Kopflagen, dagegen 25,2% Beckenend-, 17,5% Schief- und 1% Gesichtslagen. Bei den 200 von mir zusammengestellten Fällen von Nabelschnurvorfall fand ich

|     |               |     |
|-----|---------------|-----|
| I.  | Schädellagen  | 78, |
| II. | Schädellagen  | 46, |
| I.  | Gesichtslagen | 3,  |
| II. | Gesichtslagen | 3,  |
|     | Steisslagen   | 4,  |
|     | Fusslagen     | 37, |
|     | Querlagen     | 29, |

|                                                   |                                                 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Die Häufigkeit der einzelnen Lagen ist also in %: | Normaler Weise beträgt sie nach Olshausen-Weit: |
| Schädellagen: 62%.                                | 95%.                                            |
| Gesichtslagen: 3%.                                | 0,6%.                                           |
| Beckenendlagen: 20,5%.                            | 3,11%.                                          |
| Querlagen: 14,5%.                                 | 0,56%.                                          |

|                                                                                       |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Ferner verhält sich die Häufigkeit der I. Schädelstellung zur II. Schädelstellung wie | Normaler Weise ist das Verhältnis nach Hecker: |
| 78 : 46 = 1,7 : 1,                                                                    | 2,56 : 1.                                      |
| der I. Gesichtslage zur II. Gesichtslage wie 1 : 1,                                   | 1,7 : 1.                                       |

Es zeigt sich also hier, worauf auch schon Hecker hinwies, bei Nabelschnurvorfall bei Kopflagen ein häufiger als normales Vorkommen der zweiten Lage.

Bei den Kopflagen war der Kopf 10 mal etwas nach links, 9 mal etwas nach rechts abgewichen. Schief- und Steisslagen wurden 5 beobachtet. Während normaler Weise die Steisslagen doppelt so häufig als die Fusslagen sind, fand ich Fusslagen 9,25 mal so oft als Steisslagen.

Nach den Berechnungen von G. Veit kommt auf 89 Geburten eine Zwillingsgeburt. Ich fand unter den 200 von mir zusammengestellten Geburten mit Nabelschnurvorfal 8 Zwillingsgeburten, sodass schon auf 25 Geburten eine Zwillingsgeburt kommt.

Der Vorfall einer oder mehrerer Extremitäten neben dem vorliegenden Teile erleichtert ebenfalls das Zustandekommen des Nabelschnurvorfalles. Ich fand 21 mal bei Kopflagen, 18 mal bei Querlagen und einmal bei Fusslage gleichzeitig Nabelschnurvorfal und Vorfall kleiner Teile angegeben.

Fehlerhafte Gestalt und Bildung des Kindes soll gleichfalls den Vorfall der Nabelschnur begünstigen. Ich konnte bei einem Falle von Prolapsus funiculi umbilicalis Hydrocephalus mit Spina bifida ermitteln.

Hecker beobachtete ferner, dass bei den Geburten mit Nabelschnurvorfal eine auffällig grosse Zahl von Knaben zur Welt kamen. Nach Olshausen-Veit kommen durchschnittlich 106,31 Knaben auf 100 Mädchen. Bei den von mir zusammengestellten 200 Fällen wurden 114 Knaben und 86 Mädchen geboren. Es kommen danach 132,6 Knaben auf 100 Mädchen. Es lässt sich also auch hier ein bemerkenswertes Vorwiegen der Knaben konstatieren.

Seitens der mütterlichen Teile ist weiter das enge Becken, indem es die richtige Einstellung des vorliegenden Kindsteiles hindert und sein Abweichen vom Muttermunde befördert, eine sehr wichtige Prädisposition für Vorfall der Nabelschnur. Hildebrandt fand bei 109 Fällen von Nabelschnurvorfal 34 mal enges Becken. F. v. Winckel ermittelte beim Prolapsus funiculi umbilicalis 40% enge Becken und konstatierte unter 356 Geburten mit verengtem Becken 33 mal Nabelschnurvorfal. Ich fand bei den 40 klinischen Geburten mit Nabelschnurvorfal 15 mal enges Becken, das ist in 37,5% der Fälle.

In den poliklinischen Journalen waren nur selten und zwar scheinbar nur da, wo Verdacht auf enges Becken vorgelegen hatte, die Beckenmasse angegeben. Danach kommt

auf 160 poliklinische Geburten 31 mal enges Becken; also hier nur in 19,4% der Fälle.

Auch Lageveränderung des Uterus und abnorme Beweglichkeit desselben begünstigen den Vorfall der Nabelschnur. Ich fand unter den von mir zusammengestellten Fällen von Nabelschnurvorfalle dreimal starken Hängebauch und einmal Uterus pendulus angegeben. Bei einem Falle von Prolapsus funiculi umbilicalis hatte ein Cervixmyom den Kopf am Herabtreten verhindert und ihn auf die rechte Darmbeinschaukel gedrängt.

Sodann kommt der Nabelschnurvorfalle bei Mehrgebärenden unverhältnismässig häufiger vor als bei Erstgebärenden. Zacharias fand unter 28 Fällen 20 Mehr- und 8 Erstgebärende, wobei von den Mehrgebärenden 13, von den Erstgebärenden 5 mit fehlerhaften Becken behaftet waren. Ich konnte unter den 200 Fällen 176 Mehr- und 22 Erstgebärende ermitteln. Bei zwei Fällen fehlten die diesbezüglichen Angaben in den Journalen. Das Frequenzverhältnis von Mehrgebärenden zu Erstgebärenden ist danach 8:1, während es nach P. Müller in Deutschland sonst etwa 4:1 ist.

Von seiten der Placenta ist nach F. v. Winckel namentlich der tiefe Sitz und das partielle Aufsitzen des Kuchens auf dem Muttermunde eine wichtige Prädisposition für Vorfall der Nabelschnur, weil dabei der vorliegende Kindesteil nicht völlig in den unteren Gebärmutterabschnitt eintreten kann. Ich fand bei den 200 von mir zusammengestellten Fällen mit Nabelschnurvorfalle 8 mal Placenta praevia.

Von seiten der Nabelschnur sind als den Vorfall begünstigende Momente ferner abnorme Insertion und ungewöhnliche Länge anzuführen. Ich fand einmal Insertio velamentosa und einmal Insertio marginalis angegeben. Die Länge der Nabelschnur war bei den 200 Fällen nur 28 mal in den Journalen angeführt. Danach betrug die Länge

in 1 Falle 45 cm,

in 8 Fällen zwischen 50 und 60 cm,

in 6 Fällen zwischen 61 und 70 cm,

in 7 Fällen zwischen 71 und 80 cm,  
in 5 Fällen zwischen 81 und 90 cm,  
in 1 Falle 125 cm.

Die durchschnittliche Länge beträgt bei diesen 28 Fällen 71,1 cm. Nach Smoliboeki ist die Durchschnittslänge der Nabelschnur berechnet an 711 Aufzeichnungen 55,4 cm.

Endlich kann auch Hydramnion die Ursache für den Vorfall der Nabelschnur abgeben. Durch die grosse Fruchtwassermenge wird der Uterus stark ausgedehnt, und infolgedessen wird der Foetus abnorm beweglich und nimmt häufig eine fehlerhafte Lage ein, sodass im Moment des Blasen-sprunges der vollkommene Abschluss des unteren Uterin-segments durch den vorliegenden Kindesteil fehlt. Das dann unbehindert abfließende Fruchtwasser hat eine nicht unbedeutende Kraft und kann leicht die Nabelschnur mit sich reißen. Ich konnte zweimal unter den von mir zusammen-gestellten Fällen Hydramnion ermitteln.

Hugenberger wies darauf hin, dass der Vorfall der Nabelschnur auch habituell vorkommt. Er konnte ihn bei einer Frau viermal nach einander mit Kopflage, ein anderes Mal zweimal bei derselben Frau mit Schieflage ohne Becken-enge beobachten. Ich fand bei vier verschiedenen Frauen in der Anamnese angegeben, dass schon früher einmal Nabel-schnurvorfälle vorgelegen haben soll. Bei drei Fällen wurde der Vorfall der Nabelschnur beide Mal von seiten der Klinik beobachtet. Bei dem ersten Falle handelte es sich um eine II. Schädellage bei einer VII-Gebärenden mit plattem Becken. Hier war bei dem IV. Partus ebenfalls die Nabelschnur bei Kopflage vorgefallen (conf. Nr. 61). Der zweite Fall war eine Querlage bei einer VI-Gebärenden, wo beim V. Partus gleichfalls Querlage mit Nabelschnurvorfälle beobachtet wurde (conf. Nr. 108 und 96). Bei dem dritten Falle wurde ebenfalls bei zwei aufeinanderfolgenden Geburten Nabelschnur-vorfall konstatiert. Das erste Mal handelte es sich um eine II., das zweite Mal um eine I. Schädellage. Auch hier bestand gleichzeitig plattes Becken (conf. Nr. 158 und 35).

Bei dem vierten Falle endlich war der frühere Nabelschnurvorfall nicht von seiten der Klinik beobachtet worden, weshalb wohl die Angabe mit einiger Vorsicht aufzunehmen ist. Es handelte sich um eine II. Schädellage bei einer IX-Gebärenden, und hier soll beim VIII. Partus auch die Nabelschnur vorgefallen gewesen sein. Über Verengung des Beckens ist bei diesem Falle in dem Journale nichts angegeben (conf. Nr. 114).

Was die Folgen des Nabelschnurvorfalles betrifft, so ist an und für sich derselbe für die Mutter nur ausserordentlich selten von schädlichem Einfluss. Eine direkte Gefahr für die Mutter kann eigentlich nur eintreten, wenn die Nabelschnur über den vorliegenden Kindesteil so straff hingegesennt ist, dass sie sein Herabtreten wirklich hemmt. Es können dadurch irreguläre Uteruscontraktionen mit Geburtsverzögerung und Placentarincarceration als Folgen, ferner heftige Blutungen wegen Lösung der Placenta oder gar Zerreissung der Nabelschnur selbst hervorgerufen werden. Sekundär aber wird der Nabelschnurvorfall durch die zum Zwecke der Rettung des Kindes meist notwendig werdenden Enbindungsverfahren auch für die Mutter zu einem nicht ganz gleichgültigen Ereignis.

Für das Kind gehört der Nabelschnurvorfall zu den gefährlichsten Complicationen und führt bei vorliegendem Kopfe ohne geeignete Kunsthilfe fast stets den Tod des Kindes herbei. Denn durch den vorliegenden Kopf wird die vorgefallene Nabelschnur meist so stark komprimiert, dass ihre Zirkulation gänzlich aufgehoben wird. In der Regel dauert nun aber der Durchtritt des Kopfes durch das Becken so lange, dass das Kind während dieser Zeit durch Behinderung des Placentarkreislaufes abstirbt.

Die statistischen Notierungen über die Mortalität der Kinder bei Nabelschnurvorfall schwanken naturgemäss erheblich. Zum Teil kommt dies, wie Schrader erklärt, daher, dass die Grösse der Mortalität abhängig gewesen ist von den angewandten Verfahren und von der Ausbildung der betref-

fenden Methoden. Zum Teil hat die Verschiedenheit in den Angaben aber wohl auch darin ihren Grund, dass die einen Fälle, zum Beispiele solche, wo wegen bedeutender Beckenverengerung die Perforation der vorausgehenden oder nachfolgenden Kopfes nötig wurde, mitzählten, während die anderen diese unberücksichtigt liessen. Schrader hat die von 24 verschiedenen Autoren angegebenen Zahlenverhältnisse über die Mortalität der Kinder bei Nabelschnurvorfall zusammengestellt. Die geringste Mortalität weist danach La Chapelle auf mit 17,1 ‰, die grösste Giffard mit 80,9 ‰. Insgesamt kommen auf 1899 behandelte Nabelschnurvorfälle 876 totgeborene Kinder, und beträgt also deren durchschnittliche Mortalität 46,1 ‰. Scanzoni giebt eine Zusammenstellung von 12 Autoren über 743 Fälle. Danach kamen 408 Kinder tot zur Welt, sodass sich die Mortalität hier auf 54,9 ‰ stellt.

Bei den von mir aus der Hallenser Frauenklinik zusammengestellten 200 Fällen wurden 87 Kinder tot geboren oder so tief asphyktisch, dass die Wiederbelebungsversuche ohne Erfolg blieben. Es ergibt sich somit eine Mortalität von 43,5 ‰. Die Schädellagen weisen eine solche von 46,15 ‰, die Beckenendlagen eine von 29,27 ‰ und die Querlagen eine von 51,72 ‰ auf.

Hinsichtlich der Therapie beim Vorliegen der Nabelschnur geht die Ansicht aller Geburtshelfer dahin, dass man das Springen der Blase solange zu verhüten suchen muss, bis der Muttermund völlig erweitert oder wenigstens völlig dehnbar ist. Daher soll man das Mitpressen untersagen und beim Urinlassen und der Defaecation weder ein Aufstehen noch ein Aufrichten gestatten. Fritsch empfiehlt ausserdem die Kreissende mit möglichst hohem Steiss oder in vollkommene Sims'sche Seitenlage zu legen, damit das Kind nach oben respektive vom Beckeneingange wegsinkt. Ist der Kopf seitlich abgewichen, so soll man die Kreissende auf diejenige Seite legen, nach welcher der Kopf abgewichen ist. Wird hierdurch nicht ein Zurückschieben der Nabelschnur bewirkt,

so kann man nach Olshausen-Veit vorsichtig das Zurück-schieben der Schnur in der stehenden Blase versuchen.

In der Königlichen Universitäts-Frauenklinik und Poliklinik zu Halle wurde in der Zeit vom 1. April 1890 bis 31. März 1901 fünfunddreissigmal Vorliegen der Nabelschnur beobachtet. Bei 28 Fällen war der Muttermund vollständig erweitert, respektive es wurde seine vollständige Erweiterung abgewartet. Nach künstlicher Sprengung der Blase oder nach spontanen Springen derselben wurde dann die Geburt, wie eine solche mit Nabelschnurvorfalle, weiter behandelt, und so 25 lebende Kinder erzielt, sodass hier die Mortalität nur 10,71% beträgt. Bei den drei Fällen, bei denen die Kinder während der Geburt abstarben, war zweimal die Armlösung infolge engen Beckens schwierig, und einmal wurde nach Springen der Blase der Kopf durch heftige Wehen so kräftig in das ebenfalls verengte Becken hineingepresst, dass die Nabelschnur pulslos wurde, und die kindlichen Herztöne nicht mehr zu hören waren, ehe die Zange angelegt werden konnte. — Bei drei Fällen wurde die Blase gesprengt, ehe der Muttermund vollständig erweitert war; das eine Mal, wegen Hydramnions, das zweite Mal, weil die kindlichen Herztöne schlecht wurden, und das dritte Mal wegen Blutung bei Placenta praevia. Hier wurden von den drei Kindern zwei tot geboren. Endlich wurde viermal versucht, die Nabelschnur in der stehenden Blase zurück-zuschieben. Zweimal gelang dies vollständig, einmal zum grössten Teile, und einmal sprang bei diesem Versuche die Blase. Bei allen diesen vier Fällen kamen lebende Kinder zur Welt.

Die Therapie bei Nabelschnurvorfalle ist entsprechend den verschiedenen Kindeslagen eine verschiedene. Bezüglich der Behandlung bei Querlagen empfehlen ziemlich alle Geburtshelfer, nötigen Falles die Erweiterung des Muttermundes ruhig abzuwarten, zu wenden und dann sofort zu extrahieren. Von dem Versuche, die vorgefallene Nabelschnur zu repoussieren, wird fast allgemein abgeraten.

Bei den 29 von mir zusammengestellten Fällen von Querlage mit Prolapsus funiculi umbilicalis wurde einmal bei

dreimarkstückgrossem Muttermunde die frühzeitige Wendung nach Braxton-Hicks ausgeführt wegen Blutung bei Placenta praevia. Ein anderes Mal wurde bei fünfmarkstückgrossem Muttermunde durch Anziehen des gleichfalls vorgefallenen rechten Fusses gewendet. Da in beiden Fällen schon vor der Wendung der Nabelschnurpuls erloschen war, wurde natürlich beide Mal kein lebendes Kind erzielt. Bei einem dritten Falle wurde bei einmarkstückgrossem Muttermunde vergeblich versucht, die in der Scheide liegende Nabelschnur zu reponieren. Erst 4 Stunden danach war der Muttermund vollständig erweitert, sodass nunmehr die Wendung und Extraction des inzwischen abgestorbenen Kindes ausgeführt werden konnte. Bei den übrigen 26 Fällen wurde bei vollständigem, respektive fast vollständigem Muttermunde die kombinierte innere Wendung ausgeführt, und so 14 Kinder gerettet. Die Mortalität beträgt demnach 46,15%. Auffällig erscheint hier die hohe Sterblichkeit in der Poliklinik. Denn während in der stationären Klinik bei 4 Fällen nur ein Kind, das bei der infolge platten Beckens schwierigen Armlösung abstarb, verloren wurde, und somit die Mortalität nur 25% beträgt, konnten in der Poliklinik von 22 Kindern nur 11 gerettet werden. Auch wenn man einen Fall, bei dem die Perforation des nachfolgenden Kopfes nötig wurde, abzieht, weil hier das Kind so wie so auch ohne den komplizierenden Nabelschnurvorfall verloren war, beträgt die Sterblichkeit in der Poliklinik doch immer noch 47,62%. Zu erklären ist dieser Umstand wohl damit, dass in verschiedenen Fällen die Blase schon eine Reihe von Stunden vorher gesprungen war, ehe die Hilfe der Klinik nachgesucht wurde. In einem Falle waren seit dem Blasensprunge 24 Stunden, in einem anderen sogar 58 Stunden verflossen. Denn nicht nur die Wendung wird um so schwieriger, je mehr Zeit seit dem Abflusse des Fruchtwassers bis zu ihrer Ausführung vergeht, sondern auch die vorgefallene Nabelschnur ist um so länger der Gefahr ausgesetzt, auf irgend eine Weise einen schädlichen Druck zu erleiden. Dass letzteres auch bei Quer-

lagen oft genug vorkommt, geht aus den Angaben der poliklinischen Journale hervor, wonach die Nabelschnur beim Eintreffen des Assistenten in 9 Fällen nur noch schwach pulsierte, in 1 Falle sogar bereits pulslos war. Daher dürfte es, wenn man bei einer Querlage mit Vorfall der Nabelschnur einen noch nicht erweiterten Muttermund vorfindet, doch ratsam sein, dass man mit entsprechenden Mitteln versucht, die Wehen zu verstärken, um so die Erweiterung des Muttermundes, die bekanntlich bei Querlagen nach Abfluss des Fruchtwassers meist nur langsam vor sich geht, zu beschleunigen. Fehling empfiehlt, zu diesem Zwecke einen Scheidencolpeurynter einzulegen.

Die Behandlung der Beckendlagen bei gleichzeitig bestehendem Nabelschnurvorfall ist von derjenigen der unkomplizierten nur insofern verschieden, als man nötigen Falls früher extrahiert. Da dies bei Steisslagen nicht in jedem Stadium der Geburt mit der hier oft wünschenswerten Schnelligkeit möglich ist, so wird von den meisten Geburtshelfern empfohlen, bei hochstehendem Steiss ein Bein des Kindes herabzustrecken, um daran bei eintretender Indikation die Extraktion machen zu können. Ausserdem wird durch das Herabholen des Fusses der Umfang des Beckenendes verringert, und so auch der Druck auf den Nabelstrang geringer. Von dem Versuche, die vorgefallene Nabelschnur zu reponieren, wird auch hier allgemein abgeraten. Bei den in der Zeit vom 1. April 1890 bis 31. März 1901 in der Hallenser Frauenklinik und Poliklinik beobachteten 4 Steisslagen mit Nabelschnurvorfall wurde einmal nach vergeblichem Repositionsversuch ein Fuss herabgeholt und dann das Kind extrahiert. Bei den drei übrigen Fällen wurde bei vollständigem Muttermunde die Extraktion ausgeführt. In allen 4 Fällen wurden lebende Kinder erzielt. Bei den 37 Fusslagen wurde einmal bei stehender Blase die Fusslage durch äussere Handgriffe in eine Schädellage umgewandelt (conf. Nr. 13), einmal die spontane Geburt abgewartet. Hier kamen in beiden Fällen tote Kinder zur Welt. Bei den übrigen 35 Fusslagen

wurde einmal nach vergeblichem Repositionsversuch und sonst möglichst bald extrahiert, und so 26 lebende Kinder erzielt. Bei den 9 Fällen, wo tote Kinder zur Welt kamen, war dreimal die Perforation des nachfolgenden Kopfes nötig, dreimal wurde bei der ersten Untersuchung eine bereits pulslose Nabelschnur vorgefunden, einmal wurde ein faultotes Kind extrahiert, und einmal starb das Kind bei der infolge engen Beckens schwierigen Armlösung.

Was die Behandlung des Nabelschnurvorfalles bei Kopflagen betrifft, so hängt diese von dem Grade der Erweiterung des Muttermundes ab. Ist der Muttermund nur wenig erweitert, so empfiehlt die Mehrzahl der Geburtshelfer die Reposition. Bei engem, nicht dehnbarem Muttermunde ist es aber nur möglich, mittelst eines der verschiedenen zu diesem Zwecke angegebenen Instrumente zu reponieren. Oft ist jedoch auch die instrumentelle Reposition unausführbar, weil man mit dem geraden oder wenig gebogenen Stab bei engem Muttermunde nicht um den Kopf herumkommen kann. Um den schädlichen Druck des Kopfes von der Nabelschnur fernzuhalten, bleibt dann nur übrig, durch eine entsprechende Seitenlagerung der Gebärenden oder durch äussere Handgriffe den Kopf zum Abweichen zu bringen. Ausserdem verbietet man das Mitpressen. Ist der Muttermund für 2—3 Finger durchgängig, so ist nach Fritsch bereits die manuelle Reposition ausführbar, wenn die vorgefallene Nabelschnurschlinge nicht zu gross ist. Misslingt der Repositionsversuch, so ist es nach P. Müller am besten, den Kopf nach Braxton-Hicks zur Seite wegzustossen. Doch unterlässt man noch das Herabstrecken des Beines, leitet höchstens den Fuss in den Muttermund und verstärkt eventuell die Wehen durch einen Scheidencolpeurynter.

Von den von mir zusammengestellten 130 Kopflagen mit Nabelschnurvorfall wurden sieben mit für die Hand noch nicht durchgängigem Muttermunde übernommen. Bei einem von diesen Fällen wurde die Reposition mit Erfolg ausgeführt, und dann nach 6 Stunden bei vollständig erweitertem

Muttermunde mit der Zange ein lebendes Kind extrahiert. Bei einem zweiten Falle gelang die Reposition ebenfalls; nach 6 Stunden fiel aber die Nabelschnur wieder vor, und es wurde nun bei handtellergrössem Muttermunde die Wendung und darauf die Extaktion ausgeführt. Hier wurde kein lebendes Kind erzielt. Bei einem dritten Falle fiel die reponierte Nabelschnur schon nach 5 Minuten wieder vor und war nunmehr pulslos. Daher, und da ausserdem plattes Becken vorlag, wurde bei handtellergrössem Muttermunde der kindliche Schädel perforiert, und dann die Kranioklasie mit nachfolgender Extraktion vorgenommen. Bei 2 Fällen wurde die frühzeitige Wendung nach Braxton-Hicks ausgeführt, aber beide Mal kein lebendes Kind erzielt. Einmal wurde, weil die vorgefallene Nabelschnur völlig pulslos war, die spontane Geburt des abgestorbenen Kindes abgewartet, und einmal, wo der Nabelschnurpuls schon bei der ersten Untersuchung erlosch, die Perforation ausgeführt.

Ist bei Kopflagen mit Nabelschnurvorfall der Muttermund bereits so erweitert, dass er für die Hand durchgängig ist, so wird fast allgemein geraten, ebenfalls zunächst die Reposition zu versuchen. Bei der Ausführung der Reposition soll man nach Olshausen und Veit stets in Knieellenbogenlage und mit der ganzen Hand operieren. Nach vollendeter Reposition wird dann die Kreissende, ohne dass sie sich vorübergehend wieder auf den Rücken gelegt hätte, direkt in eine Seitenbauchlage gelegt und zwar auf diejenige Seite, nach welcher der Kopf abgewichen war. Der Fundus uteri mit dem Steissende des Kindes fällt dann auf diese Seite hinüber, der Kopf kommt über die Mitte des Beckeneinganges und verhindert den Wiedervorfall, indem er das untere Segment abschliesst. Ist das letztere auffallend schlaff, so ist es nach Olshausen und Veit gut, die operierende Hand nach der Reposition so lange im Cervix liegen zu lassen, bis die nächste Wehe kommt. Auch empfehlen die eben angeführten Autoren in allen Fällen von stark seitlichem Stande des Kopfes, denselben mit der äusseren Hand von aussen

auf den Beckeneingang zu drücken, während gleichzeitig die innere den Uterus versässt.

Fällt die Nabelschnur trotz mehrmaligen Bemühens immer wieder herunter, so sieht man von weiteren Repositionsversuchen ab. Steht der Kopf noch hoch und beweglich, so geht man sofort zur Wendung auf die Füße über, an die sobald als möglich die Extraktion angeschlossen wird, oder man entwickelt den Kopf, falls er tief genug steht, mit der Zange.

Unter den von mir zusammengestellten Fällen mit Nabelschnurvorfall war bei 36 Kopflagen zur Zeit der Übernahme der Geburt der Muttermund gerade für die Hand durchgängig. Bei sieben von diesen Kopflagen gelang die Reposition der Nabelschnur, und es wurde daher die spontane Geburt abgewartet, bei der aber nur 4 lebende Kinder zur Welt kamen. Diese Beobachtung, dass nach vollständig gelungener Reposition dennoch nach einiger Zeit die Herztöne schlecht wurden, und das Kind abstarb, ist schon wiederholt gemacht worden. Daher darf man sich mit dem Gelingen der Reposition nicht einfach zufrieden geben, sondern ist zu einer peinlich genauen auskultatorischen Kontrolle der kindlichen Herztöne verpflichtet, um bei Schlechterwerden derselben entweder durch die Wendung mit möglichst bald nachfolgender Extraktion, oder, wenn die erforderlichen Vorbedingungen für die Entbindung mit der Zange vorhanden sind, durch Extraktion mit dieser eventuell das Kind noch retten zu können.

Was die übrigen 29 Fälle betrifft, so wurde bei fünf vergeblich die Reposition versucht, und darauf die Wendung auf den Fuss mit nachfolgender Extraktion ausgeführt, wobei 4 lebende Kinder erzielt wurden. Bei 14 Fällen wurde ohne vorherigen Repositionsversuch auf den Fuss gewendet und meist die Extraktion bald daran angeschlossen. Es kamen hier 9 lebende und 5 tote Kinder zur Welt. Bei einem Falle, wo ein Myoma cervicis den Kopf verhinderte, tiefer zu treten, wurde nach Zurückdrängen des Tumors in das kleine Becken

ebenfalls die Wendung auf den Fuss vorgenommen, und darauf ein Foetus papyraceus extrahiert. Zweimal wurde der Kopf mit der Zange entwickelt, und so ein Kind gerettet. Bei 4 Fällen wurde eine bereits pulslose Nabelschnur vorgefunden, und daher die spontane Geburt der abgestorbenen Kinder abgewartet. Bei 3 weiteren Fällen, wo bei der ersten Untersuchung die Nabelschnur ebenfalls schon pulslos war, wurde die Erweiterung des Muttermundes abgewartet, dann die Perforation des vorliegenden Kopfes ausgeführt und in Anschluss daran die Kranioklasie und Extraktion vorgenommen.

Ist der Muttermund vollkommen erweitert, steht der Kopf fest im Becken, und ist letzteres nicht so verengt, dass es eine schnelle und leichte Extraktion unwahrscheinlich macht, so wird wohl von allen Autoren empfohlen, die Zange anzulegen, wenn es nur eben noch denkbar ist, das Leben des Kindes zu retten.

Bei den von mir zusammengestellten Fällen wurde bei sieben unter den eben angeführten Bedingungen die Zange angelegt, und so drei lebende Kinder erzielt. Bei den vier Fällen, wo tote Kinder zur Welt gebracht wurden, war bei Anlegung der Zange in zwei Fällen die Nabelschnur pulslos, in zwei Fällen pulsierte sie nur noch schwach und unregelmässig.

Anders verhält es sich aber, wenn der kindliche Kopf bei völlig oder fast völlig erweitertem Muttermunde noch beweglich über dem Beckeneingange steht. Man hat dann die Wahl zwischen manueller Reposition und zwischen Wendung! Über den in solchen Fällen vorzunehmenden therapeutischen Eingriff sind denn auch die einzelnen Geburtshelfer geteilter Ansicht. Während die einen, wie Fritsch, Gusserow, Küstner, sofort wenden wollen, befürworten die anderen, zuerst die manuelle Reposition zu versuchen. Olshausen und Veit, welche der Meinung sind, dass die manuelle Reposition bei völliger Erweiterung des Muttermundes recht gute Resultate giebt, halten die Wendung in folgenden Fällen für unbedingt indiciert:

1. „Wenn die Nabelschnur nur noch wenig frequent und schwach pulsiert. Es ist dann sehr fraglich, ob die schon erhebliche Asphyxie sich nach der Reposition wieder giebt. 2. Wenn das Becken sehr eng und die Kopfstellung infolgedessen eine sehr schlechte ist. Es ist alsdann nicht wahrscheinlich, dass der Kopf alsbald eine bessere Stellung einnehmen wird. Die Nabelschnur wird deshalb voraussichtlich doch wieder vorfallen, und die Chancen sind bei der Wendung günstiger. 3. Wenn ausser der Nabelschnur ein Arm vorgefallen ist. Die Reposition beider Teile nimmt längere Zeit in Anspruch, wobei der Puls in der Nabelschnur leicht erlischt. 4. Bei Vorfall einer grossen Masse von Nabelschnur, wenn zugleich andere ungünstige Verhältnisse seitens des Beckens oder der Schädelstellung vorhanden sind.“

Die Reposition der vorgefallenen Nabelschnur gelang bei völlig erweitertem Muttermunde bei den von mir aus der hallischen Universitäts-Frauenklinik und Poliklinik zusammengestellten Fällen fünfmal. Bei drei von diesen fünf Fällen wurde die spontane Geburt abgewartet, wobei aber nur ein Kind lebend zur Welt kam. Bei einem Falle wurde, da der eingepresste Kopf immer wieder abwich, noch nachträglich die Wendung und Extraktion ausgeführt, und bei einem Falle wurde das Kind, da die Herztöne schlecht wurden, mit der Zange extrahiert. In den beiden letzten Fällen wurden lebende Kinder erzielt.

Vergeblich wurde die Reposition bei völlig erweitertem Muttermunde zwölfmal versucht. Nach dem erfolglosen Repositionsversuche wurde dann in neun Fällen die Wendung mit sofort nachfolgender Extraktion ausgeführt, und es gelang so sieben Kinder zu retten. Bei einem Falle, wo es sich um ein schräg verengtes Becken handelte, musste nach vorausgegangener Wendung der nachfolgende Kopf perforiert werden. In zwei Fällen endlich wurde die Zange angelegt, und beidemal ein lebendes Kind extrahiert.

Die Wendung auf den Fuss ohne vorherigen Repositionsversuch wurde bei völlig erweitertem Muttermunde vierzimal

ausgeführt, und meist sofort die Extraktion daran angeschlossen. Es gelang so dreißig Kinder zu retten. Bei den sieben Fällen, wo tote Kinder zur Welt kamen, pulsierte in vier Fällen die Nabelschnur vor Ausführung der Wendung schon schwach, bei zwei Fällen handelte es sich um Gesichtslagen, und bei einem Falle war das mütterliche Becken verengt. Was die übrigen von mir zusammengestellten Kopflagen mit Nabelschnurvorfalle betrifft, bei denen zur Zeit der Übernahme der Geburt der Muttermund völlig erweitert war, so war bei zwei Fällen nach vorheriger Wendung die Perforation des nachfolgenden Kopfes wegen Beckenenge nötig; bei sechs Fällen, wo die Nabelschnur bereits pulslos war, wurde ebenfalls wegen Beckenenge die Perforation des vorliegenden Kopfes ausgeführt, und bei zwölf Fällen, wo der Nabelschnurpuls auch schon erloschen war, die spontane Geburt abgewartet.

Zum Schlusse möchte ich noch die folgenden Tabellen anfügen zur besseren Übersicht über die Erfolge, welche bei Kopflagen einerseits durch die Reposition und andererseits durch die Wendung erzielt worden sind:

I. Muttermund noch nicht völlig erweitert, aber bereits für die Hand durchgängig:

| Verlauf                                    | Zahl der behandelten Fälle | davon gerettet | Mortalität in % |
|--------------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------|
| a) Reposition gelingt<br>(spontane Geburt) | 7                          | 4              | 42,8%           |
| b) Reposition misslingt, sekundäre Wendung | 5                          | 4              | 20%             |
| c) Primäre Wendung                         | 14                         | 9              | 35,7%           |

## II. Muttermund völlig erweitert:

| Verlauf                 | Zahl der behandelten Fälle | davon gerettet | Mortalität in ‰ |
|-------------------------|----------------------------|----------------|-----------------|
| a) Reposition gelingt   | 5                          | 3              | 40 ‰            |
| spontane Geburt         | 3                          | 1              | 66,6 ‰          |
| secundärer Forceps      | 1                          | 1              | —               |
| secundäre Wendung       | 1                          | 1              | —               |
| b) Reposition misslingt | 11                         | 9              | 18,2 ‰          |
| secundärer Forceps      | 2                          | 2              | —               |
| secundäre Wendung       | 9                          | 7              | 22,2 ‰          |
| c) Primäre Wendung      | 40                         | 33             | 17,5            |

Aus diesen Tabellen geht hervor, dass bei völlig erweitertem Muttermunde durch die Wendung weit günstigere Resultate erzielt worden sind als durch die Reposition. Auch bei den Fällen, wo der Muttermund eben erst für die Hand durchgängig war, sind mehr Kinder durch die Wendung als durch die Reposition gerettet worden.

Was besonders gegen die Reposition spricht, ist der Umstand, das man trotz scheinbaren Gelingens derselben niemals des Erfolges ganz sicher sein kann. Schon der Druck auf die Schnur, der mit dem Fassen und Zurückschieben derselben unvermeidlich verbunden ist, wirkt nach Bumm schädigend auf die Circulation. Thatsächlich war denn auch, wie Tabelle II zeigt, bei den Fällen, wo der Muttermund völlig erweitert war, die Mortalität bei der Wendung nach vorherigem

vergeblichen Repositionsversuche etwas höher als bei den Fällen, wo unter den gleichen Bedingungen nur die Wendung ausgeführt wurde. Aber auch noch andere unglückliche Ereignisse können nach Ausführung der Reposition das Leben des Kindes gefährden. So kann, wie F. v. Winckel anführt, die Nabelschnur nach kurzer Zeit wieder herabgleiten und von neuem gedrückt werden, oder es können in der Nabelschnur schon Veränderungen, z. B. Zerreißung der Venen, entstanden sein, welche die Reposition erfolglos machen. Führt man dagegen die Wendung auf den Fuss aus, so beseitigt man nicht nur sicher den gefährlichen Druck des Kopfes auf die vorgefallene Nabelschnur, sondern man gewinnt zugleich die Möglichkeit, die Frucht jeder Zeit am Fusse zu extrahieren.

---

Zum Schlusse meiner Arbeit komme ich der angenehmen Pflicht nach, Herrn Professor Dr. Bumm für die mir zu dieser Arbeit gegebene Anregung bestens zu danken.

---

| No.   | Journal-<br>No | Alter | Wieviel<br>Gebär. | Becken                         |                                |     |                                |                                | Kindeslage                                                                         | Muttermund                 | Nabelschnur-<br>puls    |
|-------|----------------|-------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
|       |                |       |                   | Sp.                            | Cr.                            | Tr. | C. e.                          | C. d.                          |                                                                                    |                            |                         |
| 1890. |                |       |                   |                                |                                |     |                                |                                |                                                                                    |                            |                         |
| 1     | 225            | 22    | 1                 | 27                             | 30 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | —   | 19                             | 12                             | I. dorsoposteriore<br>Querlage.                                                    | vollständig.               | gut.                    |
| 1891. |                |       |                   |                                |                                |     |                                |                                |                                                                                    |                            |                         |
| 2     | 41             | 26    | 1                 | 25                             | 27                             | —   | 18                             | 11 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | II. Schädellage.                                                                   | vollständig.               | erloschen.              |
| 3     | 284            | 37    | 5                 | 26                             | 29                             | —   | 20                             | 12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | Gemelli:<br>A) I. Schädellage<br>B) I. Schädellage<br>mit Nabelschnur-<br>vorfall. | vollständig.               | gut.                    |
| 1892. |                |       |                   |                                |                                |     |                                |                                |                                                                                    |                            |                         |
| 4     | 292            | 26    | 2                 | 27                             | 27 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | —   | 18                             | 10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | I. Schädellage.                                                                    | vollständig.               | gut.                    |
| 5     | 335            | 30    | 3                 | 25                             | 28 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | —   | 20 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | I. Schädellage,<br>Kopf fest im<br>Beckeneingang.                                  | vollständig.               | gut.                    |
| 6     | 352            | 32    | 1                 | 26 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 27 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | —   | 20                             | 11                             | I. Schädellage.                                                                    | kleinhandteller-<br>gross. | schwach un-<br>langsam. |
| 7     | 300            | 35    | 4                 | 25                             | 27 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | —   | 19 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 11                             | I. Schädellage.                                                                    | handtellergross.           | —                       |
| 8     | 392            | 20    | 2                 | 25                             | 27                             | —   | 17                             | —                              | I. Schädellage.                                                                    | kleinhandteller-<br>gross. | gut.                    |
| 9     | 119            | 27    | 3                 | 22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 26 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | —   | 16 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 11 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | I. Schädellage                                                                     | erweitert.                 | gut.                    |

# Geburten.

| Wieviel Nabelschnur vorgefallen?                                 | Blase                                        | Therapie                                                                                                                                                                               | Kind                                                    | Bemerkungen                                         |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| —                                                                | kurz zuvor gesprungen.                       | Wendung auf den Fuss, Extraction.                                                                                                                                                      | M. l. a.                                                | linke Hand gleichfalls vorgefallen                  |
| ine grosse Schlinge.                                             | kurz zuvor gesprungen.                       | da noch kindliche Herztöne zu hören sind, Wendung und sofortige Extraction.                                                                                                            | K. a. sehr schwer asphyktisch, nicht wieder zu beleben. | Marginale Insertion d. Nabelschnur.                 |
| —                                                                | kurz zuvor gesprungen.                       | Wendung auf den Fuss und Extraction.                                                                                                                                                   | A) K. l. n. a.<br>B) M. l. n. a.                        | kleine Teile gleichfalls vorgefallen.               |
| —                                                                | kurz zuvor gesprungen.                       | vergeblicher Repositionsversuch, Wendung auf den Fuss und sofortige Extraction.                                                                                                        | K. l. a. leicht asphyktisch.                            | plattes, rhachitisches Becken.                      |
| nkleines Stück rechts neben dem Kopfe.                           | springt bei der inneren Untersuchung.        | Reposition gelingt; da die kindlichen Herztöne nicht besser werden, Forceps in tiefem Querstande.                                                                                      | M. l. a.                                                | —                                                   |
| ne circa 15 cm lange Schlinge die Scheide.                       | gesprungen.                                  | vergeblicher Repositionsversuch, danach Nabelschnurpuls erloschen. Perforation und Extraction mittels Kranioklasten.                                                                   | M. + a.                                                 | —                                                   |
| nach Springen der Blase wird die Nabelschnur der Vulva sichtbar. | —                                            | Forceps.                                                                                                                                                                               | M. a.<br>tief asphyktisch, nicht wieder zu beleben.     | —                                                   |
| ne Schlinge unter d. Mutter- undsaume.                           | kurz zuvor gesprungen.                       | Forceps.                                                                                                                                                                               | M. l. a.                                                | —                                                   |
| —                                                                | springt, wahr, die Kreissende gelagert wird. | nach dem Blasensprunge wird der Kopf durch heftige Wehen in das Becken hineingepresst. Nabelschnur pulslos, Herztöne nicht mehr zu hören. Nach 1 $\frac{1}{2}$ Stunde spontane Geburt. | M. + a.                                                 | Allgemein verengtes Becken. Nabelschnurlänge 80 cm. |

| No.         | Journal-<br>No. | Alter | Wieviel<br>Gebär. | Becken          |      |     |       |                | Kindeslage                                                                                                                                          | Muttermund                                                                                                                                                                    | Nabelschnur-<br>puls |
|-------------|-----------------|-------|-------------------|-----------------|------|-----|-------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|             |                 |       |                   | Sp.             | Cr.  | Tr. | C. e. | C. d.          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                      |
| 10<br>1893. | 188             | —     | —                 | 20 <sup>1</sup> | 24   | —   | 16    | 8 <sup>1</sup> | II. Schädellage.                                                                                                                                    | vollständig.                                                                                                                                                                  | erloschen.           |
| 11          | 376             | 33    | 5                 | —               | —    | —   | —     | —              | I. Schädellage.                                                                                                                                     | für die Hand<br>durchgängig.                                                                                                                                                  | unregelmäss.         |
| 12          | 413             | 17    | 2                 | 26              | 29   | —   | 20    | —              | II. Fusslage.                                                                                                                                       | —                                                                                                                                                                             | —                    |
| 13          | 122             | 1     | 27                | 30              | —    | 20  | 12    | 12             | I. Fusslage mit<br>Vorliegen der Na-<br>belschnur, durch<br>äuss. Handgriffe<br>in eine Beckeneing.<br>II. Schädellage<br>umgewandelt (am<br>5. V.) | am 11. V. mor-<br>gens 9 h. Kopf<br>beweglich im<br>Muttermund 5-<br>M-stück gross,<br>Blase steht, neb.<br>dem Kopfe fühlt<br>man die gut pul-<br>sierende Nabel-<br>schnur. | —                    |
| 14<br>1894. | 311             | 34    | 8                 | —               | —    | —   | —     | —              | Gemelli:<br>1.) II. Fusslage<br>mit Nabelschnur-<br>vorfall.<br>2.) II. Steisslage.                                                                 | vollständig.                                                                                                                                                                  | schwach.             |
| 15          | 310             | 22    | 3                 | 26              | 28,5 | —   | 20,5  | 11,5           | I. Schädellage.<br>Kopf beweglich<br>über d. Becken-<br>eingange, nach<br>links abgewichen.                                                         | handtellergross.                                                                                                                                                              | —                    |

| Wieviel Nabelschnur vorgefallen?    | Blase                                                                                                             | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kind                         | Bemerkungen                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| —                                   | vor 20 Stunden gesprungen.                                                                                        | Perforation, Kranioklasie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K. + a.                      | allgemein verengtes Becken. |
| eine Schlinge links neben d. Kopfe. | vor $\frac{1}{2}$ Stnde gesprungen.                                                                               | Wendung auf den Fuss, nach 2 Stunden spontane Geburt bis zum Nabel, Armlösung, Veit-Smellie.                                                                                                                                                                                                                                                                | K. l. a.                     | Placenta praevia.           |
| —                                   | —                                                                                                                 | am 16. II. künstliche Frühgeburt eingeleitet wegen chronischer Nephritis mittels Bougie;<br>am 18. II. 5 h p. m. Muttermund für 2 Finger durchgängig, die Blase wird gesprengt, ein Fuss heruntergeholt;<br>am 18. II. 11 h p. m. Kind bis zum Knie geboren Da eine komprimierte Nabelschnurschlinge hervortrat, wurde sofort die Extraction angeschlossen. | K. l. n. a.                  | —                           |
| —                                   | —                                                                                                                 | am 11. V. um 2 h. nachmittags Kopf tritt langsam tiefer, Muttermund handtellergröss. Da die Herztöne unregelmässig werden, Blasensprengung und Reposition der Nabelschnur. Trotzdem werden die Herztöne immer schlechter. Spontane Geburt.                                                                                                                  | K. + a.                      | —                           |
| —                                   | wird gesprengt.                                                                                                   | sofortige Extraction.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.) K. l. a.<br>2.) M. l. a. |                             |
| —                                   | wird gesprengt, dabei fallen mehrere Nabelschnurschl. vor und werden zwischen Kopf und Beckeneingang eingeklemmt. | Wendung auf den Fuss, Nach 12 Stunden Muttermund erst vollständig, Extraction.                                                                                                                                                                                                                                                                              | M. + a.                      | Hydramnion.                 |

| No.          | Journal-<br>No. | Alter | Wieviel<br>Gebär.            | Becken                       |                              |                              |                              |       | Kindeslage                                                                                                                               | Muttermund                | Nabelschnur-<br>puls |
|--------------|-----------------|-------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
|              |                 |       |                              | Sp.                          | Cr.                          | Tr.                          | C. e.                        | C. d. |                                                                                                                                          |                           |                      |
| 16           | 363             | 24    | 1                            | —                            | —                            | —                            | —                            | —     | I. Fusslage                                                                                                                              | vollständig.              | schwach.             |
| 17           | 137             | 2     | 26                           | 28 <sup>1</sup> <sub>1</sub> | —                            | 17 <sup>3</sup> <sub>4</sub> | 11 <sup>1</sup> <sub>1</sub> | —     | I. Dorso-anteriore<br>Querlage.                                                                                                          | kleinhandel-<br>lergross. | gut.                 |
| 18           | 2126            | 2     | 27                           | 30 <sup>1</sup> <sub>2</sub> | 34                           | —                            | —                            | —     | I. Schädellage.                                                                                                                          | 5 M.-stückgross.          | undeutlich.          |
| 19           | 6032            | 2     | 23 <sup>1</sup> <sub>2</sub> | 28                           | 30 <sup>1</sup> <sub>2</sub> | 18                           | 10 <sup>1</sup> <sub>2</sub> | —     | I. Dorso-anteriore<br>Querlage.                                                                                                          | vollständig.              | gut.                 |
| 20           | 15642           | 4     | 26                           | 29                           | 30                           | 20                           | —                            | —     | II. Schädellage<br>für die Hand<br>Kopf durch ein<br>linksseit. Myoma<br>cervicis auf die<br>rechte Darm-<br>beinschaufel ge-<br>drängt. | knapp durch-<br>gängig.   | erloschen.           |
| 21           | 23425           | 1     | 25                           | 28                           | 29                           | 17 <sup>3</sup> <sub>4</sub> | 11                           | —     | II. Schädellage.                                                                                                                         | vollständig.              | gut.                 |
| <u>1895.</u> |                 |       |                              |                              |                              |                              |                              |       |                                                                                                                                          |                           |                      |
| 22           | 3129            | 3     | 24                           | 27                           | 33 <sup>1</sup> <sub>2</sub> | 20                           | —                            | —     | II. Schädellage.                                                                                                                         | 5 M.-stückgross.          | mässig.              |

| Wieviel Nabelschnur vorgefallen?                                                                                       | Blase                                                                                                                  | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kind                                             | Bemerkungen                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nabelschnurvor-<br>der Vulva.                                                                                          | gesprungen.                                                                                                            | beide Füße werden vor die<br>Vulva gebracht. Mit den<br>beiden nächsten Wehen<br>wird das Kind bis zum<br>Nabel geboren. Armlösung,<br>Veit-Smellie.                                                                                                                            | K. l. a.                                         | —                                            |
| Convolut von<br>Schlingen im<br>Muttermunde.                                                                           | vor $\frac{1}{2}$ Stunde<br>gesprungen.                                                                                | Wendung auf den Fuss,<br>Extraction                                                                                                                                                                                                                                             | K. l. a.                                         | —                                            |
| eine Schlinge.                                                                                                         | vor $\frac{1}{2}$ Stunde<br>gesprungen.                                                                                | Reposition von Arm und<br>Nabelschnur in Narkose.<br>Danach sind die kindlichen<br>Herztöne nicht mehr zu<br>hören. Spontane Geburt.                                                                                                                                            | K. + a.                                          | rechter Arm<br>gleichfalls vor-<br>gefallen. |
| —                                                                                                                      | bei der Unter-<br>suchung springt<br>die Blase und<br>es fällt ein Teil<br>der Nabelsch.<br>und der rechte<br>Arm vor. | Wendung auf den Fuss,<br>Extraction. Bei der schwie-<br>rigen Armlösung stirbt das<br>Kind ab.                                                                                                                                                                                  | M. + a.                                          | plattes Becken.                              |
| eine Schlinge.                                                                                                         | —                                                                                                                      | Zurückdrängen des Tumors<br>aus dem kleinen Becken in<br>die Bauchhöhle. Perfora-<br>tion des Kopfes. Anlegung<br>des Kranioklasten. Da letz-<br>terer ausreißt, Wendung<br>auf den Fuss, Extraction.                                                                           | K. + a. Fötus<br>papyraceus.                     | —                                            |
| Mehrere Schlin-<br>gen in der<br>Scheide u. aus<br>der Vulva vor-<br>gefallen.                                         | kurz zuvor ge-<br>sprungen, dabei<br>Vorfall der Na-<br>belschnur.                                                     | Forceps.                                                                                                                                                                                                                                                                        | M. l. a. stirbt<br>nach 5 Tagen<br>a. Pneumonie. | Nabelschnur-<br>länge 76 cm.                 |
| eine circa 10 cm.<br>lange Schlinge<br>in der Vulva.<br>Vorne u. rechts<br>vom Kopfe ein<br>Convolut von<br>Schlingen. | vor 7 Stunden<br>gesprungen.                                                                                           | Reposition der Nabelschnur<br>mit 3 Fingern und Zurück-<br>schieben des ganzen Con-<br>voluts über den Kopf.<br>Gleichzeitig Hereindrücken<br>des Kopfes ins Becken.<br>Lagerung der Kreissenden<br>auf die linke Seite, Herz-<br>töne erholen sich schnell<br>und bleiben gut. | K. l. a. spont.<br>geboren.                      | Nabelschnur-<br>länge 84 cm.                 |

| No.          | Journal<br>No. | Alter | Wieviel<br>Gebär. | Becken                       |                              |                              |                              |                              | Kindeslage                                                                              | Muttermund      | Nabelschnur-<br>puls |
|--------------|----------------|-------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
|              |                |       |                   | Sp.                          | Cr.                          | Tr.                          | C. c.                        | C d.                         |                                                                                         |                 |                      |
| 23           | 44             | 22    | 1                 | 25 <sup>1</sup> <sub>3</sub> | 30                           | 34                           | 20 <sup>1</sup>              | —                            | I. Schädellage.                                                                         | vollständig.    | schwach.             |
| 24           | 334            | 37    | 11                | 22 <sup>1</sup> <sub>3</sub> | 25 <sup>3</sup> <sub>4</sub> | 30                           | 18                           | —                            | II. Schädellage.                                                                        | vollständig.    | gut.                 |
| 25           | 337            | 31    | 9                 | —                            | —                            | —                            | —                            | —                            | II. Fusslage.                                                                           | —               | erloschen.           |
| <u>1896.</u> |                |       |                   |                              |                              |                              |                              |                              |                                                                                         |                 |                      |
| 26           | 101            | 29    | 2                 | 24                           | 27 <sup>1</sup> <sub>1</sub> | 31 <sup>1</sup> <sub>1</sub> | 18                           | —                            | I. dorsoposteriore<br>Querlage.                                                         | —               | gut.                 |
| 27           | 132            | 24    | 2                 | 22                           | 26 <sup>1</sup>              | 30 <sup>1</sup> <sub>1</sub> | 18 <sup>1</sup> <sub>2</sub> | 10 <sup>1</sup> <sub>4</sub> | I. Schädellage.                                                                         | vollständig.    | schwach.             |
| 28           | 148            | 25    | 4                 | 25                           | 28                           | 31 <sup>1</sup> <sub>3</sub> | 20                           | 11 <sup>3</sup> <sub>4</sub> | Gemelli:<br>1.) I. Schädellage.<br>2.) I. Fusslage m.<br>Vorliegen d. Na-<br>belschnur. | vollständig.    | —                    |
| 29           | 295            | 26    | 3                 | 24                           | 28                           | 32                           | 18                           | 9 <sup>3</sup> <sub>4</sub>  | II. Schädellage.                                                                        | 5M.-stückgross. | gut.                 |
| <u>1897.</u> |                |       |                   |                              |                              |                              |                              |                              |                                                                                         |                 |                      |
| 30           | 54             | 35    | 8                 | 24                           | 27 <sup>1</sup> <sub>1</sub> | 32                           | —                            | —                            | I. unvollständige<br>Fusslage.                                                          | vollständig.    | kräftig.             |
| 31           | 346            | 40    | 2                 | 24                           | 28                           | 31 <sup>1</sup> <sub>3</sub> | 18 <sup>1</sup> <sub>2</sub> | —                            | I. Schädellage.                                                                         | vollständig.    | erloschen.           |

| Wieviel Nabelschnur vorgefallen?                    | Blase                       | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                     | Kind                                             | Bemerkungen                                                                |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| eine circa 12 cm lange Schlinge                     | vor 6 Stunden gesprungen.   | Reposition durch Eingehen mit der ganzen linken Hand. Die Herztöne erholen sich stetig und bleiben deutlich bis zum Durchschneiden des Kopfes.                                                                                                               | M. a. tief asphyktisch. nicht wieder zu beleben. | Nabelschnurlänge 62 cm.                                                    |
| mehrere Schlingen.                                  | wird gesprengt.             | Reposition, darauf tritt der Kopf tiefer, die Herztöne erholen sich.                                                                                                                                                                                         | M. l. 38 W.                                      | Nabelschnurlänge 85 cm.                                                    |
| eine Schlinge vor der Vulva.                        | vor zwölf Tagen gesprungen. | Abwarten der spontanen Geburt.                                                                                                                                                                                                                               | K. + 6 Monate.                                   | Nabelschnurlänge 56 cm.                                                    |
| eine Schlinge.                                      | wird gesprengt.             | Wendung auf den Fuss. Herabziehen des Beines bis zur Mitte des Oberschenkels. Darauf wird zunächst abgewartet. Neben dem Beine liegen in der Vagina einige pulsierende Nabelschnurschlingen. Da die Herzaction des Kindes abnimmt, Extraction, Veit-Smellie. | M. l. a.                                         | Nabelschnurlänge 65 cm. Linker Arm gleichfalls vorgefallen.                |
| —                                                   | vor 3 Tagen gesprungen.     | Wendung auf den Fuss, danach Nabelschnur pulslos. Abwarten der spontanen Geburt bis zum Schultergürtel, Armlösung, Veit-Smellie.                                                                                                                             | M. + a.                                          | Placenta praevia. Linke Hand gleichfalls vorgefallen. Nabelschnurl. 50 cm. |
| —                                                   | wird gesprengt.             | nach den ersten Wehen verlangsamen sich die Herztöne und bleiben langsam. Daher Herabholen der Füße und Extraction.                                                                                                                                          | 2 lebend. Knaben, ausge- tragen.                 | —                                                                          |
| eine 10 cm lange Nabelschnurschlinge in der Vagina. | vor 3 Tagen gesprungen.     | Reposition in Narkose. Fixieren des Kopfes durch Eindrücken während der Wehen. Langsames Erholen der Herztöne, hierauf spontane Geburt.                                                                                                                      | K. + a.                                          | plattes Becken, Nabelschnurlänge 67 cm.                                    |
| eine Schlinge vor der Vulva.                        | vor 30 Minuten gesprungen.  | nach der Geburt des Kindes bis zu den Schultern, Armlösung, Veit-Smellie.                                                                                                                                                                                    | K. l. a.                                         | Hängebauch. Nabelschnurlänge 55 cm.                                        |
| eine grosse Schlinge neben dem Kopfe.               | vor 10 Stunden gesprungen.  | draussen vergeblichen Wendungs- und Zangenversuch. Perforation, Cranioklasie.                                                                                                                                                                                | K. + a.                                          | Plattes Becken. Nabelschnurlänge 45 cm.                                    |

| No.          | Journal-<br>No. | Alter | Wieviel<br>Gebär. | Becken                         |                                |                                |                                |                                | Kindeslage                                                                      | Muttermund                | Nabelschnur-<br>puls |
|--------------|-----------------|-------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
|              |                 |       |                   | Sp.                            | Cr.                            | Tr.                            | C. e.                          | C. d.                          |                                                                                 |                           |                      |
| <u>1898.</u> |                 |       |                   |                                |                                |                                |                                |                                |                                                                                 |                           |                      |
| 32           | 388             | 28    | 3                 | 25 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 28                             | 32                             | 19                             | 9 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>  | I. Schädellage,<br>Kopf auf die<br>linke Darmbein-<br>schaufel abge-<br>wichen. | vollständig.              | langsam.             |
| 33           | 524             | 25    | 2                 | 24                             | 28                             | 30                             | 18                             | —                              | I. Schädellage.                                                                 | vollständig.              | pulslos.             |
| <u>1899.</u> |                 |       |                   |                                |                                |                                |                                |                                |                                                                                 |                           |                      |
| 34           | 437             | 24    | 1                 | 22                             | 27 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 29                             | 16 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | —                              | II. Schädellage.                                                                | vollständig.              | gut.                 |
| 35           | 82              | 27    | 4                 | 25                             | 29 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 32 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> | 18 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | —                              | I. Schädellage.                                                                 | vollständig.              | gut.                 |
| 36           | 130             | 20    | 2                 | 27                             | 33                             | 34                             | 21                             | —                              | II. Schädellage.                                                                | handtellergross.          | gut.                 |
| <u>1900.</u> |                 |       |                   |                                |                                |                                |                                |                                |                                                                                 |                           |                      |
| 37           | 586             | 27    | 1                 | 21 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 32                             | 19 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | —                              | I. Schädellage.                                                                 | vollständig.              | schwach.             |
| 38           | 55              | 21    | 2                 | 22                             | 25                             | 30                             | 17 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 10 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | II. Schädellage.                                                                | vollständig am<br>20. IV. | gut.                 |
| 39           | 269             | 30    | 2                 | 20 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 24 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 27 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | 15 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | 9                              | I. Schädellage.                                                                 | vollständig.              | erloschen.           |
| 40           | 435             | 43    | 12                | 25                             | 30                             | 32                             | 19                             | —                              | II unvollkomme-<br>ne Fusslage.                                                 | vollständig.              | langsam.             |

| Wieviel Nabelschnur vorgefallen?                                                         | Blase                        | Therapie                                                                                                                                                                                                    | Kind        | Bemerkungen                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| eine Schlinge bis zur Mitte der Scheide.                                                 | vor einer Stunde gesprungen. | vergeblicher Repositionsversuch. Wendung auf den Fuss, Extraction, Armlösung, Veit-Smellie.                                                                                                                 | K. 1. a.    | Plattes Becken.                                                               |
| im Muttermunde eine Schlinge.                                                            | vor 2 Tagen gesprungen.      | spontane Geburt abgewartet.                                                                                                                                                                                 | K. + a.     | Plattes Becken. Nabelschnurlänge 60 cm.                                       |
| Nach der Blasensprengung fällt eine Schlinge neben dem Kopfe vor.                        | wird gesprengt               | Reposition gelingt leicht.                                                                                                                                                                                  | M. + a.     | Nabelschnurlänge 60 cm.                                                       |
| —                                                                                        | vor 15 Minuten gesprengt.    | Bei einer Wehe erscheint eine Nabelschnurschlinge in der Vulva. Mit der gleich darauf einsetzenden Wehe kommt der Kopf zum Einschnneiden. Die vollständige Geburt desselben schliesst sich sofort daran an. | K. + a.     | Beim III. Partus ebenfalls Nabelschnurvorfall. Nabelschnurlänge 55 cm.        |
| —                                                                                        | wird gesprengt.              | Wendung auf den Fuss. Danach die Herztöne schlecht werden, sofortige Extraction.                                                                                                                            | M. 1. a.    | Nabelschnurlänge 75 cm.                                                       |
| eine circa 20 cm. lange Schlinge.                                                        | kurz zuvor gesprungen.       | Nach Anschlingen des ebenfalls vorgefallenen linken Fusses wird der Kopf nach oben geschoben und durch Anziehen des Beines die Wendung vervollständigt. Sofortige Extraction.                               | M. + a.     | Nabelschnurlänge 60 cm.                                                       |
| die vorliegende Nabelschnur fällt nach der Blasensprengung in einer Länge von 15 cm vor. | wird gesprengt am 20. IV.    | 19. IV. Einführung eines Colpeurynters zur Einleitung der künstlichen Frühgeburt. 20. IV. Vergeblicher Repositionsversuch, Wendung, Extraction.                                                             | K. 1. 36 W. | Allgemein gleichmässig verengtes rachitisches Becken. Nabelschnurlänge 70 cm. |
| in grosser Ausdehnung vorgefallen.                                                       | vor 24 Stunden gesprungen.   | Perforation, Kranioklasie.                                                                                                                                                                                  | K. + 38 W.  | Nabelschnurlänge 65 cm.                                                       |
| einige Schlingen in der Scheide.                                                         | vor 1 Stunde gesprungen.     | Extraction am rechten Beine. Armlösung, Veit-Smellie.                                                                                                                                                       | K. 1. a.    | Nabelschnurlänge 60 cm.                                                       |

## Poliklinische

| No.                             | Journal<br>No. | Alter | Wieviel<br>Gebär. | Becken |     |     |       |       | Kindeslage                                              | Muttermund                 | Nabelschnur-<br>puls |
|---------------------------------|----------------|-------|-------------------|--------|-----|-----|-------|-------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
|                                 |                |       |                   | Sp.    | Cr. | Tr. | C. e. | C. d. |                                                         |                            |                      |
| I. IV.<br>1890-31.<br>III. 1891 |                |       |                   |        |     |     |       |       |                                                         |                            |                      |
| 41                              | 4719           | 1     | —                 | —      | —   | —   | —     | —     | II. Schädellage,<br>Kopf auf dem<br>Beckenboden.        | vollständig.               | erloschen.           |
| 42                              | 5034           | 4     | —                 | —      | —   | —   | —     | —     | II. Schädellage.                                        | fünfmarkstück-<br>gross.   | gut.                 |
| 43                              | 7426           | 3     | —                 | —      | —   | —   | —     | —     | I. dorsoanteriore<br>Querlage.                          | über handteller-<br>gross. | —                    |
| 44                              | 8031           | 4     | —                 | —      | —   | —   | —     | —     | I. Schädellage,<br>Kopf etwas nach<br>links abgewichen. | erweitert.                 | gut.                 |
| 45                              | 9331           | 8     | —                 | —      | —   | —   | —     | —     | I. Schädellage.                                         | handtellergross.           | erloschen.           |
| 46                              | 9727           | 6     | —                 | —      | —   | —   | —     | —     | I. Schädellage.                                         | erweitert.                 | gut.                 |
| 47                              | 18125          | 4     | —                 | —      | —   | —   | —     | —     | II. Fusslage.                                           | —                          | —                    |
| 48                              | 22539          | 10    | —                 | —      | —   | —   | —     | —     | II. Schädellage.                                        | erweitert.                 | gut.                 |
| 49                              | 28431          | 7     | —                 | —      | —   | —   | —     | —     | I. Schädellage.                                         | erweitert.                 | erloschen.           |
| 50                              | 30841          | 16    | —                 | —      | —   | —   | —     | —     | I. Schädellage.                                         | handtellergross.           | —                    |

# Geburten.

| Wieviel Nabelschnur vorgefallen?                         | Blase                                         | Therapie                                                                                                                                           | Kind                                                                                   | Bemerkungen                        |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| eine lange Schlinge hängt aus der Vulva heraus.          | vor $\frac{3}{4}$ Stunde gesprungen.          | Forceps.                                                                                                                                           | K. + a.                                                                                | —                                  |
| Nabelschnur-schlinge in der Vagina.                      | vor 1 Stunde gesprungen.                      | Repositionsversuch in Nar-kose misslingt. Incision des Muttermundes, Forceps.                                                                      | M. l. a.                                                                               | —                                  |
| —                                                        | Blase steht, in ihr die Nabel-schnur fühlbar. | Sprengung der Blase, Wendung auf den Fuss. Steiss kommt spontan zum Einschneiden, schwere Armlösung.                                               | K. + a.                                                                                | —                                  |
| mehrere Nabel-schnurschlingen im oberen Teile d. Vagina. | vor $\frac{1}{2}$ Stunde gesprungen.          | vergeblicher Repositions-versuch. Wendung auf den Fuss, Extraction.                                                                                | K. l. a.                                                                               | —                                  |
| Nabelschnur-schlingen vor der Vulva.                     | vor $3\frac{1}{2}$ Stunden gesprungen.        | Exercitii causa Perforation und Extraction mittels Kranioklasten.                                                                                  | M. + a.                                                                                | —                                  |
| mehrere Schlingen vor dem Kopfe.                         | vor $5\frac{1}{2}$ Stunden gesprungen.        | Wendung auf den Fuss, Extraction.                                                                                                                  | M. l. a.                                                                               | —                                  |
| —                                                        | vor 3 Stunden gesprungen.                     | Extraction durch die Heb-amme vor Ankunft des Assistenten wegen angeb-lichen Nabelschnurvorfalles.                                                 | K. l. a.<br>schr schwer<br>asphyktisch,<br>nach $\frac{1}{2}$ Stunde<br>wieder belebt. | —                                  |
| eine grosse Nabelschnur-schlinge in der Vagina           | vor 4 Stunden gesprungen.                     | Wendung auf den Fuss, Extraction.                                                                                                                  | K. l. a.                                                                               | ein Arm gleich-falls vorge-fallen. |
| eine ca. 40 cm lange Schlinge in der Vagina.             | vor 3 Stunden gesprungen.                     | Perforation und Extraction mittels Kranioklasten.                                                                                                  | K. + a.                                                                                | —                                  |
| —                                                        | steht.                                        | Fixierung des Kopfes. Blasensprengung, vergeb-licher Versuch, die danach vorgefallene Nabelschnur zu reponieren; Wendung auf den Fuss, Extraction. | K. l. a.                                                                               | Hydramnion.                        |

| No. | Geburts-<br>No. | Alter | Wieviel<br>Gebur. | Becken |                                |     |       |       | Kindeslage                                                                      | Muttermund                                | Nabelschnur-<br>puls |
|-----|-----------------|-------|-------------------|--------|--------------------------------|-----|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
|     |                 |       |                   | Sp.    | Cr.                            | Tr. | C. e. | C. d. |                                                                                 |                                           |                      |
| 51  | 332             | 39    | 3                 | —      | —                              | —   | —     | —     | I. Fusslage.                                                                    | vollständig er-<br>weitert.               | schwach.             |
| 52  | 352             | 40    | 6                 | —      | —                              | —   | —     | —     | II. Fusslage.                                                                   | ziemlich er-<br>weitert.                  | schwach.             |
| 53  | 420             | 35    | 11                | —      | —                              | —   | —     | —     | II. Schädellage.                                                                | dreimarkstück-<br>gross.                  | —                    |
| 54  | 448             | 26    | 2                 | —      | —                              | —   | —     | —     | I. vollkommene<br>Fusslage.                                                     | vollständig er-<br>weitert.               | schwach.             |
| 55  | 454             | 21    | 1                 | 23     | 26 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | —   | 18    | —     | I. Schädellage.                                                                 | noch schmaler<br>Saum<br>vorhanden.       | erloschen.           |
| 56  | 464             | 21    | 2                 | —      | —                              | —   | —     | —     | Gemelli:<br>A. Fusslage mit<br>Nabelschnurvorf-<br>fall.<br>B. I. Schädellage.  | vollständig.                              | pulslos.             |
| 57  | 494             | 26    | 2                 | —      | —                              | —   | —     | —     | II. Schädellage,<br>Kopf ziemlich fest<br>im Beckenein-<br>gange.               | —                                         | pulsiert.            |
| 58  | 502             | 36    | 9                 | —      | —                              | —   | —     | —     | I. Schädellage,<br>Kopf auf die<br>linke Darmbein-<br>schaufel abge-<br>wichen. | bis auf kleinen<br>Saum voll-<br>ständig. | gut.                 |

| Wieviel Nabelschnur vorgefallen?                             | Blase                                  | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kind                                             | Bemerkungen                                                   |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ca. $\frac{1}{4}$ Meter vor der Vulva.                       | vor $\frac{3}{4}$ Stunde gesprungen.   | Extraction.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M. l. a.                                         | —                                                             |
| ca. $\frac{1}{2}$ Meter fällt nach d. Blasen- sprengung vor. | steht, in ihr Nabelschnur u. Füße.     | Sprengung der Blase. Ex- traktion. Arme schwer zu lösen, da das Becken etwas verengt.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K. + a.                                          | —                                                             |
| —                                                            | vor 2 Stunden gesprungen.              | Tamponade. Bei Entfernung des Tampons fällt die Nabelschnur bis vor die Vagina vor. Kombinierte äussere Wendung misslingt, weil Fuss nicht zu erreichen. Der Kopf drängt sich nun in das untere Uterinsegment ein. Vergäblicher Repositionsversuch. Nach $2\frac{1}{2}$ Stunden Muttermund fünf- markstückgross. Perforation, Kranioklast gleitet ab. Da- her Wendung. Extraction. | K. + n. a.                                       | Placenta prae- via.                                           |
| eine ca. $\frac{1}{2}$ Meter lange Schlinge vor der Vulva.   | vor $3\frac{1}{4}$ Stunden gesprungen. | Rasche Extraction.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K. l. a.                                         | —                                                             |
| ca. $\frac{1}{2}$ Meter.                                     | vor $2\frac{1}{4}$ Stunden gesprungen. | Perforation, Extraction mittels Kranioklastes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K. + a.                                          | allgemein ver- engtes Becken. Nabelschnur sehr lang und dick. |
| Nabelschnur- schlingen in der Vagina.                        | vor 1 Stunde gesprungen.               | A. Extraction<br>B. spontan geboren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A. m. faultot<br>n. a.<br>B. m. l. nicht ganz a. | —                                                             |
| Nabelschnur bis vor die Vulva vorgefallen.                   | —                                      | In Narkose lässt sich der Kopf mühsam zurückdrän- gen. Wendung auf den Fuss, Extraction.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K. l. a.                                         | —                                                             |
| eine Schlinge neben den Kopfe.                               | —                                      | Wendung auf den Fuss, rasche Extraction.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K. l. a.                                         | —                                                             |

| No.                           | Journal<br>No. | Alter | Wieviel<br>Gebär. | Becken |     |     |       |                  | Kindeslage                                                                           | Muttermund                              | Nabelschnur-<br>puls    |
|-------------------------------|----------------|-------|-------------------|--------|-----|-----|-------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
|                               |                |       |                   | Sp.    | Cr. | Tr. | C. e. | C. d.            |                                                                                      |                                         |                         |
| 1. IV.<br>1891—1.<br>IV. 1892 |                |       |                   |        |     |     |       |                  |                                                                                      |                                         |                         |
| 59                            | 58             | 26    | 5                 | —      | —   | —   | —     | —                | I. Steisslage.                                                                       | dreimarkstück-<br>gross.                | gut.                    |
| 60                            | 60             | 23    | 2                 | —      | —   | —   | —     | —                | I. dorsoanteriore<br>Querlage.                                                       | vollständig er-<br>weitert.             | gut.                    |
| 61                            | 120            | 35    | 7                 | —      | —   | —   | —     | 10 $\frac{1}{4}$ | II. Schädellage.                                                                     | nahezu voll-<br>ständig er-<br>weitert. | schwach.                |
| 62                            | 187            | 33    | 3                 | 23     | 26  | —   | —     | 9                | I. Schädellage.                                                                      | nahezu voll-<br>ständig er-<br>weitert. | schwach und<br>langsam. |
| 63                            | 211            | 25    | 2                 | —      | —   | —   | —     | —                | I. Schädellage,<br>Kopf auf die lin-<br>ke Darmbein-<br>schaufel abge-<br>wichen.    | fünfmarkstück-<br>gross.                | gut.                    |
| 64                            | 260            | —     | 5                 | —      | —   | —   | —     | 9 $\frac{1}{2}$  | II. Schädellage.                                                                     | vollständig.                            | schwach.                |
| 65                            | 307            | 36    | 8                 | —      | —   | —   | —     | —                | II. Schädellage.                                                                     | vollständig.                            | gut.                    |
| 66                            | 342            | 29    | 2                 | —      | —   | —   | —     | —                | Gemelli:<br>A. I. Schädellage.<br>B. II. Schädellage<br>mit Nabelschnur-<br>vorfall. | vollständig.                            | schwach.                |

| Wieviel Nabelschnur vorgefallen?                                                  | Blase                                   | Therapie                                                                                                                                                 | Kind                             | Bemerkungen                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eine Schlinge.                                                                    | vor 2 Stunden gesprungen.               | Repositionsversuch in Seitenlage bleibt erfolglos. Herabholen des linken Fusses u. sofortige Extraction, weil die Nabelschnur nur noch schwach pulsiert. | K. l. a.                         |                                                                                                              |
| eine grosse Schlinge.                                                             | vor 1 Stunde gesprungen.                | Wendung und Extraction.                                                                                                                                  | K. l. n. a.                      | Rechte Hand gleichfalls vorgefallen.                                                                         |
| —                                                                                 | —                                       | Wendung, Extraction. Rechtsseitiger Cervixriss durch Seidennähte geschlossen.                                                                            | K. l. a.                         | Rechter Arm gleichfalls vorgefallen. Plattes Becken. IV. P. Nabelschnurvorfal (Polikl. Journal 1886 Nr. 42). |
| eine grosse Schlinge.                                                             | vor $\frac{1}{2}$ Stunde gesprungen.    | Wendung, Perforation des nachfolgenden Kopfes. Trotzdem folgt der Kopf nicht, vielmehr reisst der Rumpf ab. Extraction des Kopfes mit Kranioklast.       | M. + a.                          | allgemein verengtes Becken.                                                                                  |
| eine um den ebenfalls vorgefallenen rechten Arm geschlungene Nabelschnurschlinge. | vor 1 $\frac{3}{4}$ Stunden gesprungen. | Repositionsversuch des Armes samt Nabelschnur misslingt, Wendung, Extraction.                                                                            | K. l. a.                         | —                                                                                                            |
| ein Convolut von Nabelschnurschlingen.                                            | kurz zuvor gesprungen.                  | Wendung, Extraction.                                                                                                                                     | M. l. a.                         | Pelvis plana rhachitica.                                                                                     |
| Convolut verschiedener Nabelschnurschlingen.                                      | vor 1 Stunde gesprungen.                | Wendung, Extraction.                                                                                                                                     | K. l. a.                         | Rechter Arm gleichfalls vorgefallen.                                                                         |
| eine grosse Nabelschnurschlinge.                                                  | gesprungen.                             | Wendung wegen stark contrahierten Uterusses unmöglich. Vergeblicher Repositionsversuch. Forceps. Extraction rasch.                                       | A. K. l. n. a.<br>B. M. l. n. a. | —                                                                                                            |

| No.                           | Journal-<br>No | Alter | Wieviel<br>(Gebär. | Becken |     |     |       |       | Kindeslage                                                                        | Muttermund                 | Nabelschnur-<br>puls    |
|-------------------------------|----------------|-------|--------------------|--------|-----|-----|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
|                               |                |       |                    | Sp.    | Cr. | Tr. | C. e. | C. d. |                                                                                   |                            |                         |
| 67                            | 364            | 45    | 13                 | —      | —   | —   | —     | —     | II. Fusslage.                                                                     | vollständig.               | gut.                    |
| 68                            | 491            | 31    | 7                  | —      | —   | —   | —     | —     | II. dorsoanteriore<br>Querlage.                                                   | beinah vollstän-<br>dig.   | schwach.                |
| 69                            | 510            | 30    | 3                  | —      | —   | —   | —     | —     | I. dorsoanteriore<br>Querlage.                                                    | vollständig.               | gut.                    |
| 70                            | 531            | 23    | 1                  | —      | —   | —   | —     | —     | II. Gesichtslage.                                                                 | kleinhandteller-<br>gross. | erloschen.              |
| 1. IV.<br>1892—1.<br>IV. 1893 | 44             | 36    | 6                  | —      | —   | —   | —     | —     | II. dorsoanteriore<br>Querlage.                                                   | vollständig.               | schwach und<br>langsam. |
| 71                            |                |       |                    |        |     |     |       |       |                                                                                   |                            |                         |
| 72                            | 133            | 30    | 3                  | —      | —   | —   | —     | —     | II. dorsoposteriore<br>Querlage.                                                  | vollständig.               | gut.                    |
| 73                            | 139            | 37    | 12                 | —      | —   | —   | —     | —     | I. Schädellage,<br>Kopf nach rechts<br>abgewichen.                                | vollständig.               | kräftig.                |
| 74                            | 200            | 36    | 5                  | —      | —   | —   | —     | —     | I. Gesichtslage.                                                                  | vollständig.               | schwach und<br>langsam. |
| 75                            | 216            | 37    | 4                  | —      | —   | —   | —     | —     | II. unvollkomme-<br>ne Fusslage.<br>Kopf auf der lin-<br>ken Beckenschau-<br>fel. | vollständig.               | gut.                    |
| 76                            | 226            | 33    | 7                  | —      | —   | —   | —     | —     | II. vollkommene<br>Fusslage.                                                      | handteller-<br>gross.      | schwach und<br>langsam. |

| Wieviel Nabelschnur vorgefallen?                    | Blase                         | Therapie                                                                                                                                                       | Kind                                                         | Bemerkungen                                                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| eine Schlinge von circa 10 cm Länge vor der Vagina. | vor 4 1/2 Stunden gesprungen. | Extraction. Armlösung sehr erschwert. Da Frucht mittlerweile abgestorben, Perforation des nachfolgenden Kopfes.                                                | M. + a.                                                      | enges Becken.                                               |
| eine kleine Schlinge.                               | vor 58 Stunden gesprungen.    | Wendung, Extraction. Schwierigkeit macht es, den Kopf durch das Becken zu ziehen. Während der vergeblichen Bemühungen stirbt die Frucht ab. Daher Perforation. | K. + a.                                                      | rechter Arm gleichfalls vorgefallen.                        |
| —                                                   | steht noch.                   | Während der Wendung fällt eine lange Nabelschnurschlinge vor die Scheide.                                                                                      | M. tief asphyktisch, stirbt in 1 Stunde.                     | —                                                           |
| eine Schlinge.                                      | —                             | Spontane Geburt.                                                                                                                                               | M. + a.                                                      | —                                                           |
| circa 30 cm.                                        | vor 8 Stunden gesprungen.     | Wendung auf den Fuss, Extraction.                                                                                                                              | K. a. tief asphyktisch, Wiederbelebungsversuche ohne Erfolg. | —                                                           |
| 5 cm aus der Scheide heraushängend.                 | vor 2 Stunden gesprungen.     | Wendung auf den Fuss, Extraction.                                                                                                                              | M. l. a.                                                     | mässig plattes Becken. Rechter Arm gleichfalls vorgefallen. |
| mehrere Schlingen in der Vagina.                    | vor 2 Stunden gesprungen.     | Wendung auf den Fuss, Extraction.                                                                                                                              | K. l. a.                                                     | —                                                           |
| circa 15 cm in der Scheide liegend.                 | vor 1/2 Stunde gesprungen.    | Wendung auf den Fuss, Extraction, wobei die Nabelschnur abreisst.                                                                                              | K. l. a.                                                     | —                                                           |
| circa 5 cm.                                         | vor 1/2 Stunde gesprungen.    | Anschlingen des Fusses und unter Zug daran Zurückschieben des Kopfes. Extraction.                                                                              | K. l. a.                                                     | —                                                           |
| eine Schlinge.                                      | vor 12 Stunden gesprungen.    | Extraction.                                                                                                                                                    | M. n. g. a. l.                                               | —                                                           |

| No. | Journal-<br>No. | Alter | Wieviel<br>gebar. | Becken                         |                                |     |       |       | Kindeslage                                                  | Muttermund                  | Nabelschnur-<br>puls         |
|-----|-----------------|-------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----|-------|-------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|     |                 |       |                   | Sp.                            | Cr.                            | Tr. | C. e. | C. d. |                                                             |                             |                              |
| 77  | 235             | 24    | 1                 | 21 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 24 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 28  | 16    | 10    | I. Schädellage.                                             | fast völlig er-<br>weitert. | gut.                         |
| 78  | 278             | 40    | 15                | —                              | —                              | —   | —     | —     | II. Schädellage,<br>Kopf nach rechts<br>abgewichen.         | handteller-<br>gross.       | schwach.                     |
| 79  | 378             | 21    | 1                 | —                              | —                              | —   | —     | 10    | II. Schädellage.                                            | vollständig.                | langsam, un-<br>regelmässig. |
| 80  | 380             | 30    | 2                 | —                              | —                              | —   | —     | —     | I. vollkommene<br>Fusslage.                                 | handteller-<br>gross.       | gut.                         |
| 81  | 398             | 29    | 3                 | —                              | —                              | —   | —     | —     | I. Schiefelage, Kopf<br>links unten, Steiss<br>rechts oben. | handteller-<br>gross.       | gut.                         |
| 82  | 474             | 39    | 7                 | —                              | —                              | —   | —     | —     | II. Schädellage,<br>Kopf etwas nach<br>rechts stehend.      | vollständig.                | unregel-<br>mässig.          |
| 83  | 489             | 31    | 7                 | —                              | —                              | —   | —     | —     | I. dorsoanteriore<br>Querlage.                              | vollständig.                | gut.                         |
| 84  | 530             | 41    | 11                | —                              | —                              | —   | —     | —     | I. vollkommene<br>Fusslage.                                 | vollständig.                | —                            |

| Wieviel Nabelschnur vorgefallen?                                                                                                                           | Blase                      | Therapie                                                                                                                                             | Kind     | Bemerkungen                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mehrere Schlingen.                                                                                                                                         | kurz zuvor gesprungen.     | Repositionsversuch in Knieellenbogenlage. Wendung auf den Fuss, Extraction. Perforation des nachfolgenden Kopfes.                                    | K. + a.  | schräg verengtes Becken. Mit 6 Jahren linksseitiger Beinbruch. Linkes Bein atrophisch, hochstehender Trochanter, l. Hüftgelenk ankylotisch. |
| mehrere Schlingen in der Scheide liegend.                                                                                                                  | vor 14 Stunden gesprungen. | Repositionsversuch. Wendung auf den Fuss, sofortige Extraction.                                                                                      | K. l. a. | Uterus pendulus.                                                                                                                            |
| eine circa 8 cm lange Schlinge in der Vagina.                                                                                                              | vor 1 Stunde gesprungen.   | Wendung auf den Fuss, sofortige Extraction.                                                                                                          | K. l. a. | allgemein verengtes plattes Becken.                                                                                                         |
| eine kleine Schlinge.                                                                                                                                      | vor 1/2 Stunde gesprungen. | Beim Einschneiden der Füße fällt eine circa 15 cm lange Nabelschnurschlinge aus der Vulva. Da deren Puls langsam und unregelmässig wird, Extraction. | K. l. a. | —                                                                                                                                           |
| eine circa 8 cm lange Schlinge.                                                                                                                            | vor 1 Stunde gesprungen.   | Vergeblicher Repositionsversuch. Wendung, sofortige Extraction.                                                                                      | K. l. a. | rechter Arm gleichfalls vorgefallen.                                                                                                        |
| eine circa 12 cm lange Schlinge in der Scheide liegend.                                                                                                    | vor 2 Stunden gesprungen.  | Wendung auf den Fuss, Extraction sofort abgeschlossen.                                                                                               | M. l. a. | —                                                                                                                                           |
| circa 5 cm.                                                                                                                                                | vor 4 Stunden gesprungen.  | Wendung, Extraction.                                                                                                                                 | M. l. a. | rechter Arm gleichfalls vorgefallen.                                                                                                        |
| im Laufe der Geburt zeigt sich, dass die Nabelschnur bei starker Flexion der Unterschenkel durch die Kniekehle gehend in den Beckenkanal eingeführt wurde. | vor 1 Stunde gesprungen.   | Nabelschnur wird über den Unterschenkel zurückgestreift. Armlösung, umgekehrter Prager Handgriff.                                                    | K. + a.  | —                                                                                                                                           |

| No. | Journal<br>No.  | Alter | Wieviel<br>Gebär. | Becken |     |     |       |       | Kindeslage                       | Muttermund                             | Nabelschnur<br>puls |
|-----|-----------------|-------|-------------------|--------|-----|-----|-------|-------|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
|     |                 |       |                   | Sp.    | Cr. | Tr. | C. e. | C. d. |                                  |                                        |                     |
| 85  | 534             | 40    | 13                | —      | —   | —   | —     | —     | I. Schädellage.                  | vollständig.                           | unregel-<br>mässig. |
| 86  | 560             | 36    | 7                 | —      | —   | —   | —     | —     | I. Schädellage.                  | über zweimark-<br>stückgross.          | —                   |
| 87  | 592             | 34    | 8                 | —      | —   | —   | —     | —     | II. unvollkomme-<br>ne Fusslage. | dreimarkstück-<br>gross.               | chwach.             |
| 88  | 1. IV.<br>1893. | 31.   |                   |        |     |     |       |       |                                  |                                        |                     |
|     | III. 1894       |       |                   |        |     |     |       |       |                                  |                                        |                     |
| 88  | 3140            | 8     | 8                 | —      | —   | —   | —     | —     | I. Schädellage.                  | etwas über<br>zweimarkstück-<br>gross. | schlecht.           |
| 89  | 129             | 22    | 3                 | —      | —   | —   | —     | 10    | II. Schädellage.                 | vollständig.                           | gut.                |

| Wieviel Nabelschnur vorgefallen?                                                           | Blase                                                                | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kind        | Bemerkungen                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eine circa 20 cm lange Schlinge.                                                           | vor 11 Stunden gesprungen.                                           | Mittlerer Schrägstandsforceps mit Vermeidung der vorgefallenen Nabelschnur. Extraction leicht, trotzdem Kind tod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M. + a.     | —                                                                                                                            |
| —                                                                                          | steht, darin Nabelschnur rechts vor dem Schädel.                     | Nabelschnur mit der linken Hand in die Höhe geschoben, Kopf von aussen auf den Eingang fixiert. Gelingt Blasensprung infolge Brechens der Patientin. Kombinierte äussere Wendung. Dabei fällt, nachdem das Knie bereits in der Scheide, wieder eine Nabelschnurschlinge vor, die sich nicht zurückbringen lässt.                                                                                                                                                     | M. l. a.    | als der Steiss den Muttermund passiert, hört plötzlich der Nabelschnurpuls auf, darum schnelle Extraction. Placenta praevia. |
| circa 25 cm.                                                                               | vor $\frac{1}{2}$ Stunde gesprungen, dabei Nabelschnurvorfall.       | Versuch der Reposition. Herunterholen des Fusses und Extraction bei gut fünfmarkstückgrossem Muttermunde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K. l. n. a. | —                                                                                                                            |
| eine Schlinge in der Vulva.                                                                | vor $\frac{3}{4}$ Stunde gesprungen, dabei Nabelschnurvorfall.       | Combinirte äussere Wendung, linker Fuss vor die Vulva geleitet. Da die Nabelschnurschlinge sehr lang ist und sich nicht zurückbringen lässt, wird die Umdrehung nicht vollendet, um Druck zu vermeiden. Nabelschnurpuls erholt sich, wird erst nach 2 Stunden bei besserer Wehentätigkeit wieder schlecht. Extraction bei circa handteller-grossem Muttermunde gelingt bis zum Kopfe leicht. Mittlerweile Nabelschnur pulslos. Perforation des nachfolgenden Kopfes. | K. + a.     | —                                                                                                                            |
| Beim Frucht-wasserabfluss fallen verschiedene Nabelschnurschlingen bis nahe zur Vulva vor. | springt bei dem Versuche, die vorliegende Nabelschnur zu reponieren. | Wendung auf den Fuss, sofortige Extraction.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M. l. a.    | rhachitisch plat-tes Becken.                                                                                                 |

| No.                                 | Journal-<br>No. | Alter | Wieviel<br>Gebär. | Becken |     |     |       |       | Kindeslage                       | Muttermund                             | Nabelschnur-<br>puls                 |
|-------------------------------------|-----------------|-------|-------------------|--------|-----|-----|-------|-------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
|                                     |                 |       |                   | Sp.    | Cr. | Tr. | C. e. | C. d. |                                  |                                        |                                      |
| 90                                  | 15442           | 7     | —                 | —      | —   | —   | —     | —     | I. Gesichtslage.                 | fast vollständig.                      | schlecht.                            |
| 91                                  | 17325           | 2     | —                 | —      | —   | —   | —     | —     | II. dorsoposteriore<br>Querlage. | vollständig.                           | gut.                                 |
| 92                                  | 23029           | 4     | —                 | —      | —   | —   | —     | —     | I. unvollkommene<br>Fusslage.    | über zweimark-<br>stückgross.          | gut.                                 |
| 93                                  | 28428           | 4     | —                 | —      | —   | —   | —     | —     | II. dorsoanteriore<br>Querlage.  | einmarkstück-<br>gross.                | gut.                                 |
| 94                                  | 32335           | 6     | —                 | —      | —   | —   | —     | —     | I. Schädellage.                  | handteller-<br>gross.                  | gut.                                 |
| 95                                  | 36027           | 3     | —                 | —      | —   | —   | —     | —     | I. Schädellage.                  | etwas über<br>dreimarkstück-<br>gross. | erloschen.                           |
| 96                                  | 40031           | 4     | —                 | —      | —   | —   | —     | —     | II. dorsoposteriore<br>Querlage. | vollständig.                           | schlecht.                            |
| 97                                  | 42332           | 7     | —                 | —      | —   | —   | —     | —     | I. dorsoanteriore<br>Querlage.   | vollständig.                           | gut.                                 |
| 1. IV.<br>1894—1.<br>IV. 1895<br>98 | 630             | 3     | —                 | —      | —   | —   | —     | —     | I. Schädellage.                  | fünfmarsstück-<br>gross.               | gut.                                 |
| 99                                  | 1140            | 15    | —                 | —      | —   | —   | —     | —     | II. Schädellage.                 | für drei Finger<br>durchgängig.        | erlischt bei d<br>Unter-<br>suchung. |
| 100                                 | 4427            | 5     | —                 | —      | —   | —   | —     | —     | I. Gesichtslage.                 | fünfmarsstück-<br>gross.               | —                                    |
| 101                                 | 6038            | 8     | —                 | —      | —   | —   | —     | —     | II. dorsoanteriore<br>Querlage.  | vollständig.                           | gut.                                 |

| Wieviel Nabelschnur vorgefallen?               | Blase                                                 | Therapie                                                                                                                                                          | Kind                     | Bemerkungen                                                             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| eine Knäuel Nabelschnur-schlingen.             | vor 3 Stunden gesprungen.                             | Wendung auf den Fuss, sofortige Extraction.                                                                                                                       | K. + a.                  | —                                                                       |
| verschiedene Schlingen.                        | vor 13 Stunden gesprungen.                            | Wendung auf den Fuss, sofortige Extraction.                                                                                                                       | M. 1. a.                 | rechter Arm gleichfalls vorgefallen.                                    |
| eine Schlinge.                                 | vor 2 Tagen gesprungen.                               | Extraction.                                                                                                                                                       | K VII. Monat. l. 2 Tage. | Placenta prae-via.                                                      |
| ein grosses Nabelschnur-packet in der Scheide. | vor 1 Stunde gesprungen.                              | Vergeblicher Repositions-versuch. 4 Stunden später Kind tot. Bei vollständigem Muttermunde Wendung auf den Fuss, Extraction.                                      | M. + a.                  | linke Hand gleichfalls vorgefallen.                                     |
| eine Schlinge von circa 5 cm Länge.            | vor 15 Stunden gesprungen.                            | Reposition der Nabelschnur und der gleichfalls vorgefallenen linken Hand in Narkose. Spontane Geburt.                                                             | M. 1. a.                 | —                                                                       |
| circa 20 cm in der Vagina.                     | vor 1/2 Stunde gesprungen.                            | Spontane Geburt                                                                                                                                                   | M. + a.                  | Insertio velamentosa der Nabelschnur.                                   |
| grosses Convolut von Schlingen.                | vor 1/2 Stunde gesprungen.                            | Wendung, sofortige Extraction.                                                                                                                                    | K. + a.                  | rechter Arm gleichfalls vorgefallen.                                    |
| ein Convolut von Schlingen.                    | steht.                                                | Wendung auf den Fuss, sofortige Extraction.                                                                                                                       | M. 1. a.                 | —                                                                       |
| lang vor die Vulva.                            | vor 5 Stunden gesprungen.                             | Wendung, sofortige Extraction.                                                                                                                                    | K. + a.                  | —                                                                       |
| grosses Convolut.                              | vor 1 Stunde gesprungen.                              | Perforation, Extraction.                                                                                                                                          | M. + n. a.               | —                                                                       |
| Convolut von Schlingen.                        | steht.                                                | bei kleinhandteller-grossem Muttermunde Sprengung d. Blase wegen schlechter werdender kindlichen Herz-töne. Repositionsversuch. Wendung auf den Fuss. Extraction. | M. + a.                  | linker Arm gleichfalls vorgefallen. Allgemein verengtes plattes Becken. |
| Convolut von Nabelschnur-schlingen.            | steht. Beim Blasensprunge fällt die Nabel-schnur vor. | Wendung auf den Fuss, Extraction nach wenigen Minuten angeschlossen.                                                                                              | K. 1. a.                 | linker Arm gleichfalls vorgefallen.                                     |

| No. | Journal-<br>No. | Alter | Wieviel<br>Gebär.              | Becken                         |     |     |                                |       | Kindeslage                                              | Muttermund                   | Nabelschnur-<br>puls               |
|-----|-----------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|-----|-----|--------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
|     |                 |       |                                | Sp.                            | Cr. | Tr. | C. e.                          | C. d. |                                                         |                              |                                    |
| 102 | 6633            | 5     | —                              | —                              | —   | —   | —                              | —     | I. Schädellage.                                         | nahezu voll-<br>ständig.     | gut.                               |
| 103 | 12030           | 5     | —                              | —                              | —   | —   | —                              | —     | II. Fusslage.                                           | vollständig.                 | sehr langsam<br>und schwach.       |
| 104 | 17929           | 4     | —                              | —                              | —   | —   | —                              | —     | I. Schädellage.                                         | —                            | schwach und<br>unregel-<br>mässig. |
| 105 | 24831           | 2     | 25                             | 27                             | 31  | —   | 10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | —     | I. Schädellage.                                         | vollständig.                 | gut.                               |
| 106 | 33525           | 4     | —                              | —                              | —   | —   | —                              | —     | I. Schief-<br>lage.                                     | fünfmarkstück-<br>gross.     | —                                  |
| 107 | 35130           | 6     | 22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 26 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 31  | 18  | —                              | —     | I. Schief-<br>lage,<br>Kopf etwas nach<br>links.        | für die Hand<br>durchgängig. | gut.                               |
| 108 | 40132           | 6     | —                              | —                              | —   | —   | —                              | —     | II. dorsoantere<br>Querlage.                            | —                            | gut.                               |
| 109 | 46628           | 3     | —                              | —                              | —   | —   | —                              | —     | I. Schädellage<br>(Vorderhaupts-<br>lage.)              | fünfmarkstück-<br>gross.     | erloschen.                         |
| 110 | 47431           | 1     | —                              | —                              | —   | —   | —                              | —     | I. Schädellage,<br>Kopf etwas nach<br>links abgewichen. | erweitert.                   | schwach und<br>unregel-<br>mässig. |
| 111 | 49028           | 6     | —                              | —                              | —   | —   | —                              | —     | I. unvollkommene<br>Fusslage.                           | erweitert.                   | gut.                               |

| Wieviel Nabelschnur vorgefallen?             | Blase                                                                            | Therapie                                                                                                                                                  | Kind           | Bemerkungen                                                                             |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| mehrere Schlingen.                           | steht, darin mehrere Nabelschnurschlingen fühlbar.                               | Blasensprengung. Wendung auf den Fuss. Extraction nach wenigen Minuten abgeschlossen.                                                                     | K. l. a.       | —                                                                                       |
| Convolut von Schlingen in der Scheide.       | vor 1½ Stunden gesprungen.                                                       | Extraction.                                                                                                                                               | M. + a.        | rechter Arm gleichfalls vorgefallen.                                                    |
| Convolut von Schlingen in der Scheide.       | vor ½ Stunde gesprungen.                                                         | vergeblicher Repositionsversuch, Wendung auf den Fuss, Extraction.                                                                                        | M. + a.        | —                                                                                       |
| eine fingerlange Schlinge.                   | gesprungen.                                                                      | Reposition. Der eingepresste Kopf weicht immer wieder ab. Da die Herztöne schlecht werden, Wendung auf den Fuss, sofortige Extraction.                    | M. l. a.       | leicht verengtes Becken.                                                                |
| —                                            | steht; beim Sprengen derselben fällt ein grosses Paket Nabelschnurschlingen vor. | Wendung auf den Fuss. Die Blutung steht nach Einleiten des Knies in die Vulva, aber Nabelschnur pulslos, Herztöne undeutlich. Daher schonende Extraction. | K. l. a.       | Placenta praevia.                                                                       |
| mehrere Schlingen in der Vagina.             | soeben gesprungen.                                                               | Wendung auf beide Füsse, sofortige Extraction.                                                                                                            | K. l. a.       | enges Becken.                                                                           |
| mehrere Schlingen im Muttermunde.            | kurz zuvor gesprungen.                                                           | Wendung auf den Fuss, sofortige Extraction.                                                                                                               | K. l. a.       | linke Hand gleichfalls vorgefallen. V. Partus ebenfalls Nabelschnurvorfall, cf. Nr. 96. |
| ca. 30 cm.                                   | vor 8 Wochen gesprungen.                                                         | spontane Geburt.                                                                                                                                          | K. + a.        | Hängebauch.                                                                             |
| mehrere Schlingen bis zur Mitte der Scheide. | vor 1½ Stunde gesprungen.                                                        | der kindliche Kopf tritt bei stärkerer Wehentätigkeit ein. Hohe Zange.                                                                                    | M. l. n. g. a. | —                                                                                       |
| —                                            | steht, beim Springen der Blase Nabelschnurvorfall.                               | Ergreifen und Herabstrecken des Fusses, Extraction.                                                                                                       | K. l. a.       | —                                                                                       |

| No.                             | Journal<br>No. | Alter<br>Wochen<br>Gebär. | Becken |     |     |       |       | Kindeslage                                                                                                              | Muttermund                   | Nabelschnur<br>puls |
|---------------------------------|----------------|---------------------------|--------|-----|-----|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
|                                 |                |                           | Sp.    | Cr. | Tr. | C. e. | C. d. |                                                                                                                         |                              |                     |
| 112                             | 573            | —                         | —      | —   | —   | —     | —     | Gemelli :<br>A. in Schädellage<br>bereits geboren.<br>B. I. unvollkom-<br>mene Fusslage<br>mit Nabelschnur-<br>vorfall. | erweitert.                   | gut.                |
| 1. IV.<br>1895 — 1.<br>IV. 1896 |                |                           |        |     |     |       |       |                                                                                                                         |                              |                     |
| 113                             | 1718           | 1                         | —      | —   | —   | —     | —     | I. Schädellage.                                                                                                         | vollständig.                 | erloschen.          |
| 114                             | 2538           | 9                         | —      | —   | —   | —     | —     | II. Schädellage.                                                                                                        | handteller-<br>gross.        | schwach.            |
| 115                             | 2827           | 2                         | —      | —   | —   | —     | —     | I. dorsoanteriore<br>Querlage.                                                                                          | vollständig.                 | gut.                |
| 116                             | 6225           | 4                         | —      | —   | —   | —     | —     | I. Fusslage.                                                                                                            | vollständig.                 | gut.                |
| 117                             | 8132           | 2                         | —      | —   | —   | —     | —     | Gemelli :<br>A. I. Schädellage.<br>B. II. Schädellage<br>mit Nabelschnur-<br>vorfall.                                   | vollständig.                 | gut.                |
| 118                             | 12135          | 4                         | —      | —   | —   | —     | —     | I. Schädellage.                                                                                                         | —                            | —                   |
| 119                             | 16732          | 10                        | —      | —   | —   | —     | —     | II. Fusslage.                                                                                                           | für 2 Finger<br>durchgängig. | erloschen.          |

| Wieviel Nabelschnur vorgefallen?                                                | Blase                         | Therapie                                                                                                                                  | Kind           | Bemerkungen                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|
| beim Blasen-<br>sprunge Nabel-<br>schnurvorf. all.                              | steht.                        | Abwarten, nach 3½ Stunden<br>Extraction.                                                                                                  | M. l. n. a.    | —                                                          |
| eine kleine<br>Schlinge vor der<br>Vulva.                                       | vor 2½ Stunden<br>gesprungen. | spontane Geburt.                                                                                                                          | K. + a.        | —                                                          |
| in der Vagina<br>eine Schlinge.                                                 | vor ½ Stunde<br>gesprungen.   | Wendung auf den Fuss, so-<br>fortige Extraction.                                                                                          | K. + a.        | VII. Partus<br>gleich-<br>falls Nabel-<br>schnurvorf. all. |
| nach Sprengung<br>der Blase fühlt<br>man mehrere<br>Schlingen in<br>der Vagina. | steht.                        | Wendung auf den Fuss, so-<br>fortige Extraction.                                                                                          | K. l. a.       | rechter Arm<br>gleichfalls vor-<br>gefallen.               |
| mehrere Schlin-<br>gen.                                                         | vor 4 Stunden<br>gesprungen.  | Herabstrecken des rechten<br>Beines, worauf Kind spon-<br>tan bis zum Nabel geboren<br>wird. Darauf Armlösung,<br>Veit-Smellie.           | K. l. a.       | —                                                          |
| nach Sprengung<br>der Blase fällt<br>die Nabel-<br>schnur vor.                  | steht.                        | Wendung und sofortige Ex-<br>traction.                                                                                                    | M. l. n. g. a. | —                                                          |
| —                                                                               | vor 50 Minuten<br>gesprungen. | bei der Ankunft des Assis-<br>tenten kräftige Presswehen,<br>wobei der Kopf schnell<br>durchschneidet mit vorge-<br>fallener Nabelschnur. | K. + a.        | —                                                          |
| eine grosse<br>Schlinge vor<br>der Vulva.                                       | —                             | Herabholen des Beines bis<br>in die Vulva. Kind bis<br>zum Schulterblatt spontan<br>geboren. Perforation des<br>nachfolgenden Kopfes.     | K. + n. a.     | —                                                          |

| No. | Journal-<br>No. | Alter | Wieviel<br>Gebär. | Becken |     |     |                                |                                | Kindeslage                                              | Muttermund                  | Nabelschnur-<br>puls                                                                                                             |
|-----|-----------------|-------|-------------------|--------|-----|-----|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                 |       |                   | Sp.    | Cr. | Tr. | C. e.                          | C. d.                          |                                                         |                             |                                                                                                                                  |
| 120 | 294             | 37    | 8                 | —      | —   | —   | —                              | —                              | II. Schädellage.                                        | vollständig.                |                                                                                                                                  |
| 121 | 339             | 26    | 4                 | —      | —   | —   | —                              | —                              | I. dorsoposteriore<br>Querlage.                         | fast vollständig.           | schwach und<br>langsam.                                                                                                          |
| 122 | 343             | 36    | 9                 | —      | —   | —   | —                              | —                              | II. dorsoanteriore<br>Querlage.                         | vollständig.                | gut.                                                                                                                             |
| 123 | 383             | 21    | 1                 | —      | —   | —   | —                              | —                              | I. Fusslage.                                            | vollständig.                | gut.                                                                                                                             |
| 124 | 434             | 36    | 9                 | —      | —   | —   | —                              | —                              | I. Schädellage.                                         | fast völlig er-<br>weitert. | pulslos.                                                                                                                         |
| 125 | 439             | 41    | 7                 | —      | —   | —   | —                              | —                              | II. Gesichtslage.                                       | vollständig.                | die anfangs<br>eben noch<br>wahrgenom-<br>mene Pul-<br>sation ist nach<br>Beendigung<br>der Unter-<br>suchung ver-<br>schwunden. |
| 126 | 485             | 41    | 9                 | —      | —   | —   | —                              | —                              | I. Fusslage.                                            | fast vollständig.           | gut.                                                                                                                             |
| 127 | 506             | 36    | 9                 | —      | —   | —   | —                              | —                              | I. Schädellage,<br>Kopf etwas nach<br>links abgewichen. | vollständig.                | eben noch<br>fühlbar.                                                                                                            |
| 128 | 544             | 37    | 8                 | 24     | 26  | 30  | 17 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | 10 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | II. Schädellage,<br>Kopf nach rechts<br>abgewichen.     | vollständig.                | erloschen.                                                                                                                       |

| Wieviel Nabelschnur vorgefallen?                         | Blase                                                                                  | Therapie                                                                                                                                                                                             | Kind        | Bemerkungen                                                                               |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| —                                                        | steht, in ihr ein grosses Convolut von Nabelschnurschlingen.                           | Sprengung der Blase, nachdem die vor dem Kopfe liegenden Nabelschnurschlingen zum grössten Teile innerhalb der Eihäute über den Kopf reponiert waren. Wendung auf beide Füsse, sofortige Extraction. | K. l. a.    | —                                                                                         |
| —                                                        | steht, in ihr ein grosses Convolut von Nabelschnurschlingen und der linke Arm fühlbar. | Sprengung der Blase und teilweise Reposition der sich entgegendrängenden Nabelschnurschlingen. Wendung auf den Fuss, sofortige Extraction.                                                           | M. l. a.    | —                                                                                         |
| 2 grosse Schlingen in der Vagina.                        | vor 3 Stunden gesprungen.                                                              | Wendung auf den Fuss, nach $\frac{1}{4}$ Stunde Extraction.                                                                                                                                          | M. l. a.    | —                                                                                         |
| beim Strecken d. rech. Fusses fällt die Nabelschnur vor. | vor $3\frac{1}{2}$ Stunden gesprungen.                                                 | Da Nabelschnurpulsation schwach wird, Extraction.                                                                                                                                                    | M. l. n. a. | Nabelschnurlänge 75 cm.                                                                   |
| eine ca. 15 cm lange Schlinge                            | vor $\frac{1}{2}$ Stunde gesprungen.                                                   | spontane Geburt.                                                                                                                                                                                     | K. + a.     | Nabelschnurlänge 90 cm.                                                                   |
| eine ca. 15 cm lange Schlinge in der Scheide.            | vor 4 Stunden gesprungen.                                                              | Wendung auf den Fuss, sofortige Extraction.                                                                                                                                                          | K. + a.     | linker Arm gleichfalls vorgefallen.                                                       |
| eine 30 cm lange Schlinge vor der Vulva.                 | —                                                                                      | Herabholen des Fusses, Extraction.                                                                                                                                                                   | K. l. a.    | —                                                                                         |
| eine 10 cm lange Schlinge.                               | vor 5 Stunden gesprungen.                                                              | Wendung auf den Fuss, sofortige Extraction.                                                                                                                                                          | K. l. a.    | beide Füsse gleichfalls vorgefallen.                                                      |
| ein grosses Convolut von Schlingen.                      | vor 7 Stunden gesprungen.                                                              | Reposition des Fusses, Fixation des Kopfes, Perforation, Extraction mit Kranioklast.                                                                                                                 | K. + a.     | Rhachitisch plattes Becken. Linker Fuss gleichfalls vorgefallen. Sehr starker Hängebauch. |

| No.                            | Journal-<br>No | Alter | Wieviel<br>(Gebär.) | Becken                         |                                |                                |       |      | Kindeslage                                                    | Muttermund               | Nabelschnur-<br>puls                                    |
|--------------------------------|----------------|-------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                |                |       |                     | Sp.                            | Cr.                            | Tr.                            | C. e. | C d. |                                                               |                          |                                                         |
| 129                            | 563            | 28    | 4                   | —                              | —                              | —                              | —     | —    | I. Schädellage.                                               | vollständig.             | erloschen.                                              |
| 130                            | 571            | 23    | 3                   | —                              | —                              | —                              | —     | —    | II. unvollkom-<br>mene Fusslage.                              | vollständig.             | gut.                                                    |
| 131                            | 619            | 30    | 5                   | —                              | —                              | —                              | —     | —    | II. Schädellage.                                              | vollständig.             | ganz schwach                                            |
| 1. IV.<br>1896-31.<br>IV. 1897 |                |       |                     |                                |                                |                                |       |      |                                                               |                          |                                                         |
| 132                            | 91             | 43    | 4                   | 26 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 32 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 22    | —    | I. Schädellage.                                               | dreimarkstück-<br>gross. | erlischt, als<br>der Kopf in<br>der Wehe an-<br>drängt. |
| 133                            | 144            | 23    | 1                   | 23                             | 28                             | 31                             | 18    | —    | I. Schädellage.                                               | vollständig.             | erloschen.                                              |
| 134                            | 166            | 29    | 5                   | —                              | —                              | —                              | —     | —    | II. dorsoposteriore<br>Querlage.                              | fast vollständig.        | regelmässig.                                            |
| 135                            | 175            | 30    | 1                   | 24                             | 28                             | 30                             | 18    | —    | I. Fusslage.                                                  | vollständig.             | unregel-<br>mässig.                                     |
| 136                            | 190            | 26    | 1                   | —                              | —                              | —                              | —     | —    | Zwillinge, beide<br>in I. Steisslage.                         | vollständig.             | gut.                                                    |
| 137                            | 285            | 39    | 10                  | —                              | —                              | —                              | —     | —    | II. Schädellage.                                              | vollständig.             | schwach.                                                |
| 138                            | 351            | 33    | 6                   | —                              | —                              | —                              | —     | —    | I. Schädellage.                                               | dreimarkstück-<br>gross. | gut.                                                    |
| 139                            | 380            | 34    | 8                   | —                              | —                              | —                              | —     | —    | I. Schädellage,<br>Kopf etwas nach<br>rechts abge-<br>wichen. | fünfmarkstück-<br>gross. | erloschen.                                              |

| Wieviel Nabelschnur vorgefallen?                     | Blase                                                       | Therapie                                                                                                                       | Kind                                                             | Bemerkungen                              |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| eine Schlinge in der Vulva.                          | vor $\frac{1}{2}$ Stunde gesprungen.                        | spontane Geburt.                                                                                                               | M. + a.                                                          | Nabelschnurlänge 80 cm.                  |
| —                                                    | steht, in ihr linker Fuss und vor demselben d. Nabelschnur. | Sprengung der Blase, Extraction und Armlösung.                                                                                 | M. l. a.                                                         | —                                        |
| eine ca. 15 cm lange Schlinge in der Vagina.         | vor $\frac{3}{4}$ Stunde gesprungen.                        | Forceps (quer),                                                                                                                | K. + a.                                                          | —                                        |
| eine Schlinge . Muttermunde.                         | vor 4 Tagen gesprungen.                                     | kombinierte äussere Wendung auf den Fuss. Herztöne danach nicht mehr zu hören. Daher wird abgewartet. Armlösung. Veit-Smellie. | M. + a.                                                          | —                                        |
| eine ca. 12 cm lange Schlinge in der Vulva sichtbar. | vor $\frac{1}{2}$ Stunde gesprungen.                        | spontane Geburt.                                                                                                               | K. + a.                                                          | —                                        |
| eine Schlinge . Muttermunde.                         | vor $\frac{3}{4}$ Stunde gesprungen.                        | Wendung auf den Fuss, Armlösung, Veit-Smellie.                                                                                 | K. l. a.                                                         | —                                        |
| eine Schlinge zwischen den Füßen in der Vagina.      | vor $\frac{1}{2}$ Stunde gesprungen.                        | Extraction, Armlösung, Perforation des nachfolgenden Kopfes.                                                                   | K. + a. Hydrocephalus, Spina bifida.                             | allgemein gleichmässig verengtes Becken. |
| eine Schlinge.                                       | vor $\frac{3}{4}$ Stunde gesprungen.                        | Extraction am Steisse beim 1. Zwillinge; der zweite spontan geboren.                                                           | A. M. l. a.<br>B. M. l. a.                                       | —                                        |
| eine grosse Schlinge hängt aus der Vulva             | vor 7 Stunden gesprungen.                                   | Wendung auf den Fuss, sofortige Extraction.                                                                                    | K. l. a.                                                         | —                                        |
| ein grosses Convolut von Schlingen in der Vagina.    | vor $\frac{1}{2}$ Stunde gesprungen.                        | Reposition. Hineindrücken des Kopfes. Nach 6 Stunden Muttermund vollständig. Da die Herztöne langsam werden Forceps.           | M. l. a.                                                         | —                                        |
| eine ca. 20 cm lange Schlinge in der Vagina.         | —                                                           | Lagerung auf die rechte Seite. Nach 24 Stunden Muttermund handtellergross. Perforation und Extraction mit Kranioklast.         | K. + 50 cm lang, zeigt schon erhebliche Macerationerscheinungen. | —                                        |

| No.                           | Journal-<br>No | Alter | Wieviel<br>Gebär. | Becken |     |     |       |       | Kindeslage                                                                           | Muttermund                   | Nabelschnur-<br>puls          |
|-------------------------------|----------------|-------|-------------------|--------|-----|-----|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|                               |                |       |                   | Sp.    | Cr. | Tr. | C. e. | C. d. |                                                                                      |                              |                               |
| 140                           | 382            | 26    | 5                 | —      | —   | —   | —     | —     | Gemelli :<br>A) I. Schädellage.<br>B) I. Schädellage<br>mit Nabelschnur-<br>vorfall. | vollständig.                 | gut.                          |
| 141                           | 403            | 36    | 6                 | —      | —   | —   | —     | —     | I. Schädellage,<br>Kopf nach links<br>abgewichen.                                    | vollständig.                 | kräftig.                      |
| 142                           | 473            | 34    | 7                 | —      | —   | —   | —     | —     | II. Schädellage.                                                                     | fünfmärkstüch-<br>gross.     | langsam.                      |
| 143                           | 486            | 39    | 11                | —      | —   | —   | —     | —     | II. Fusslage.                                                                        | vollständig.                 | kräftig.                      |
| 144                           | 536            | 36    | 4                 | —      | —   | —   | —     | —     | I. Fusslage.                                                                         | vollständig.                 | gut.                          |
| 145                           | 565            | 38    | 11                | —      | —   | —   | —     | —     | I. Schädellage.                                                                      | fünfmärkstüch-<br>gross.     | schwach, aber<br>regelmässig. |
| 1. IV.<br>1897—1.<br>IV. 1898 |                |       |                   |        |     |     |       |       |                                                                                      |                              |                               |
| 146                           | 117            | 32    | 4                 | —      | —   | —   | —     | —     | I. vollkommene<br>Fusslage.                                                          | vollständig.                 | gut.                          |
| 147                           | 132            | 41    | 8                 | 22     | 25  | 30  | 18    | —     | II. Gesichtslage.                                                                    | vollständig.                 | schwach.                      |
| 148                           | 156            | 35    | 6                 | —      | —   | —   | —     | —     | I. Schiefelage.                                                                      | für 2 Finger<br>durchgängig. | schwach.                      |

| Wieviel Nabelschnur vorgefallen?                            | Blase                                                                         | Therapie                                                                                                                                                                                                              | Kind                       | Bemerkungen                          |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| —                                                           | Blase des 2. Zwillings steht noch, in ihr ein grosses Convolut von Schlingen. | nach Sprengung der Blase gelingt es nicht, die Schlingen neben dem nach links abgewichenen Kopfe zu reponieren. Wendung auf den Fuss, sofortige Extraction.                                                           | A) K. l. a.<br>B) M. l. a. | —                                    |
| eingrosses Convolut von Schlingen in der Scheide.           | vor 1 Stunde gesprungen.                                                      | Wendung auf den Fuss, sofortige Extraction.                                                                                                                                                                           | M. l. a.                   | rechter Arm gleichfalls vorgefallen. |
| eine 16 cm lange Schlinge vor der Vulva.                    | gesprungen.                                                                   | Reposition der Nabelschnur. Nach 12 Stunden spontane Geburt.                                                                                                                                                          | K. l. a.                   | —                                    |
| beide Füsse in der Scheide, zwischen ihnen die Nabelschnur. | vor $\frac{1}{2}$ Stunde gesprungen.                                          | Herausleiten der Füsse aus der Vulva, Armlösung, umgekehrter Prager Handgriff.                                                                                                                                        | M. l. a.                   | —                                    |
| eine grosse Schlinge in der Scheide.                        | vor 2 Stunden gesprungen.                                                     | Frucht bis zum Steisse spontan geboren. Extraction, Armlösung, Veit-Smellie.                                                                                                                                          | K. l. 37. Woche            | —                                    |
| mehrere Schlingen.                                          | vor 1 Stunde gesprungen.                                                      | vergeblicher Repositionsversuch. Wendung nach Braxton - Hicks. Abwarten bis Muttermund vollständig Extraction wegen febris sub partu (38,5).                                                                          | K. l. n. a.                | —                                    |
| eine Schlinge in der Vagina.                                | vor 27 Stunden gesprungen.                                                    | bis zum Steisse spontane Geburt, danach Nabelschnur pulslos, daher Extraction.                                                                                                                                        | M. l. 37. Woche            | —                                    |
| dicht hinter der Symphyse eine ca. 8 cm. lange Schlinge.    | vor 3 Stunden gesprungen.                                                     | Wendung auf den Fuss, sofortige Extraction.                                                                                                                                                                           | M. l. a.                   | allgemein verengtes Becken.          |
| eine 20 cm lange Schlinge vor der Vulva.                    | —                                                                             | Reposition der Nabelschnur in Narkose und in Knieellenbogenlage. Lagerung auf die linke Seite. Nach 6 Stunden Nabelschnur wieder vorgefallen. Muttermund handtellergross. Wendung auf den Fuss, sofortige Extraction. | K. + a.                    | —                                    |

| No. | Journal-<br>No. | Alter | Wieviel<br>Gebär. | Becken                         |                                |                                |                                |                               | Kindeslage                       | Muttermund                 | Nabelschnur-<br>puls    |
|-----|-----------------|-------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|
|     |                 |       |                   | Sp.                            | Cr.                            | Tr.                            | C. e.                          | C. d.                         |                                  |                            |                         |
| 149 | 221             | 23    | 2                 | —                              | —                              | —                              | —                              | —                             | I. dorsoposteriore<br>Querlage.  | vollständig.               | schwach und<br>langsam. |
| 150 | 289             | 33    | 6                 | —                              | —                              | —                              | —                              | —                             | I. unvollkommene<br>Fusslage.    | vollständig.               | gut.                    |
| 151 | 313             | 40    | 8                 | —                              | —                              | —                              | —                              | —                             | I. dorsoposteriore<br>Querlage.  | dreimarkstück-<br>gross.   | erloschen.              |
| 152 | 321             | 31    | 5                 | 22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 25 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 30                             | 17                             | 10                            | I. Schädellage.                  | vollständig.               | gut.                    |
| 153 | 337             | 35    | 4                 | —                              | —                              | —                              | —                              | —                             | II. vollkommene<br>Fusslage.     | handtellergröss.           | erloschen.              |
| 154 | 343             | 36    | 13                | 23                             | 27                             | 31                             | 17 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | —                             | I. Schädellage.                  | vollständig.               | schwach.                |
| 155 | 373             | 27    | 14                | —                              | —                              | —                              | —                              | —                             | II. gemischte<br>Steisslage.     | fast handteller-<br>gross. | schwach.                |
| 156 | 375             | 34    | 8                 | —                              | —                              | —                              | —                              | —                             | I. Schädellage.                  | nahezu voll-<br>ständig.   | schwach.                |
| 157 | 403             | 42    | 7                 | —                              | —                              | —                              | —                              | —                             | I. unvollkommene<br>Fusslage.    | fünfmarkstück-<br>gross.   | erloschen.              |
| 158 | 427             | 25    | 3                 | 25 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 29 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 17 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 9 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | II. Schädellage.                 | dreimarkstück-<br>gross.   | —                       |
| 159 | 436             | 43    | 6                 | —                              | —                              | —                              | —                              | —                             | I. Steisslage.                   | vollständig.               | erloschen.              |
| 160 | 445             | 32    | 4                 | —                              | —                              | —                              | —                              | —                             | II. dorsoposteriore<br>Querlage. | vollständig.               | schwach.                |

| Wieviel Nabelschnur vorgefallen?                                     | Blase                                             | Therapie                                                                                                                                         | Kind      | Bemerkungen                          |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| eine ca. 12 cm lange Schlinge in der Scheide.                        | vor 2 Stunden gesprungen.                         | Wendung auf den Fuss, sofortige Extraction.                                                                                                      | K. + a.   | linke Hand gleichfalls vorgefallen.  |
| —                                                                    | steht, in ihr eine Schlinge fühlbar.              | Sprengung der Blase und Herableiten des Fusses in die Vulva, sofortige Extraction.                                                               | K. l. a.  | —                                    |
| mehrere Schlingen.                                                   | kurz zuvor gesprungen.                            | combinirte Wendung nach Braxton-Hicks. Danach steht die Blutung. Arm-lösung, Veit-Smellie.                                                       | M. + a.   | Placenta prae-via lateralis.         |
| nach Sprengung der Blase fällt eine 30 cm lange Schlinge vor.        | steht, in ihr ein Convolut von Schlingen fühlbar. | Wendung auf den Fuss, Extraction.                                                                                                                | M. l. a.  | einfach plattes Becken.              |
| 45 cm lang zur Vulva heraus-hängend.                                 | vor 7 Stunden gesprungen.                         | Herabstreckung des vorderen Fusses, Extraction.                                                                                                  | M. + a.   | —                                    |
| eine ca. 15 cm lange Schlinge zwischen Kopf und hinterer Beckenwand. | vor 3 $\frac{1}{2}$ Stunde gesprungen.            | Wendung auf den Fuss, sofortige Extraction.                                                                                                      | K. l. a.  | plattes Becken.                      |
| eine ca. 10 cm lange Schlinge in der Vagina.                         | vor 1 Stunde gesprungen.                          | Herabstrecken des vorderen Fusses. Arm-lösung. Veit-Smellie.                                                                                     | M. l. a.  | —                                    |
| eine ca. 10 cm lange Schlinge.                                       | vor 1 $\frac{1}{2}$ Stunde gesprungen.            | Wendung auf den Fuss, sofortige Extraction.                                                                                                      | K. + a.   | rechte Hand gleichfalls vorgefallen. |
| eine Schlinge.                                                       | vor 4 Tagen gesprungen.                           | spontane Geburt.                                                                                                                                 | M + n. a. | —                                    |
| grosses Convolut von Schlingen in der Scheide.                       | vor 6 Stunden gesprungen.                         | Reposition. Nach 5 Minuten fällt die Nabelschnur wieder vor und ist jetzt pulslos. Bei handteller-grossem Muttermunde Perforation, Kranioklasie. | K. + a.   | einfach plattes Becken.              |
| eine Schlinge vor der Vulva.                                         | vor 8 Stunden gesprungen.                         | Extraction, weil noch Herz-töne zu hören sind, Arm-lösung, Veit-Smellie.                                                                         | M. l. a.  | —                                    |
| eine grosse Schlinge in der Scheide.                                 | kurz zuvor gesprungen.                            | Wendung auf den Fuss, sofortige Extraction, da Nabelschnur pulslos.                                                                              | M. + a.   | rechter Arm gleichfalls vorgefallen. |

| No.                          | Journal<br>No. | Alter | Wieviel<br>Gebär. | Becken |                                |                                |                                |                                | Kindeslage                                          | Muttermund        | Nabelschnur-<br>puls |
|------------------------------|----------------|-------|-------------------|--------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
|                              |                |       |                   | Sp.    | Cr.                            | Tr.                            | C. e.]                         | C. d.                          |                                                     |                   |                      |
| 161                          | 496            | 32    | 5                 | —      | —                              | —                              | —                              | —                              | I. vollkommene Fusslage.                            | vollständig.      | gut.                 |
| 162                          | 543            | 30    | 3                 | 24     | 27                             | 30 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 18                             | —                              | I. Schädellage.                                     | vollständig.      | sehr schwach.        |
| 163                          | 588            | 27    | 2                 | —      | —                              | —                              | —                              | —                              | II. Schädellage, Kopf etwas nach rechts abgewichen. | handtellergröss.  | gut.                 |
| 164                          | 610            | 25    | 1                 | —      | —                              | —                              | —                              | —                              | II. dorsoposteriore Querlage.                       | fast vollständig. | erloschen.           |
| 1. IV. 1898-31.<br>III. 1900 |                |       |                   |        |                                |                                |                                |                                |                                                     |                   |                      |
| 165                          | 1              | 24    | 6                 | 23     | 25                             | 29 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 16                             | —                              | II. Schädellage.                                    | fast vollständig. | gut.                 |
| 166                          | 5              | 35    | 8                 | —      | —                              | —                              | —                              | —                              | II. dorsoanteriore Querlage.                        | fast vollständig. | sehr schwach.        |
| 167                          | 13             | 34    | 5                 | 21     | 25                             | 31                             | 16                             | 10                             | II. Schädellage.                                    | fast vollständig. | erloschen.           |
| 168                          | 43             | 34    | 4                 | —      | —                              | —                              | —                              | —                              | I. Schädellage.                                     | vollständig.      | gut.                 |
| 169                          | 153            | 20    | 2                 | 24     | 28                             | 32 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 16 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 10 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | I. Schädellage.                                     | handtellergröss.  | erloschen.           |
| 170                          | 188            | 29    | 2                 | —      | —                              | —                              | —                              | —                              | I. Schädellage, Kopf nach links abgewichen.         | vollständig.      | gut.                 |
| 171                          | 193            | 36    | 7                 | 23     | 26 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 31                             | 17                             | 10                             | I. Schädellage.                                     | vollständig.      | gut.                 |

| Wieviel Nabelschnur vorgefallen?                      | Blase                                                      | Therapie                                                                                                                                                          | Kind      | Bemerkungen                                         |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|
| eine Schlinge in der Vulva.                           | vor $1\frac{1}{2}$ Stunde gesprungen.                      | Armlösung, Veit-Smellie.                                                                                                                                          | K. l. a.  | —                                                   |
| eine grosse Schlinge in der Scheide.                  | kurz zuvor gesprungen.                                     | Repositionsversuch, Wendung auf den Fuss, sofortige Extraction.                                                                                                   | K. l. a.  | —                                                   |
| —                                                     | steht, in ihr 2 Hände zu fühlen.                           | nach Sprengung der Blase fühlt man die über den Scheitel verlaufende Nabelschnur. Wendung auf den Fuss, Extraction.                                               | K. l. a.  | —                                                   |
| eine ca. 15 cm lange Schlinge hängt aus der Vulva.    | vor 24 Stunden gesprungen.                                 | Wendung auf den Fuss, Extraction, Armlösung, Veit-Smellie.                                                                                                        | M + n. a. | rechte Hand gleichfalls vorgefallen.                |
| die ganze Scheide mit Schlingen ausgefüllt.           | vor $21\frac{1}{2}$ Stunden gesprungen.                    | Wendung auf den Fuss, sofortige Extraction.                                                                                                                       | K. + a.   | platt rhachitisches Becken.                         |
| eine Schlinge in der Scheide.                         | vor 4 Stunden gesprungen.                                  | Wendung auf den Fuss, sofortige Extraction.                                                                                                                       | M. + a.   | Nabelschnurlänge 125 cm.                            |
| eine grosse Schlinge                                  | vor $31\frac{1}{2}$ Stunden gesprungen.                    | spontane Geburt.                                                                                                                                                  | M + a.    | plattes rhachitisches Becken.                       |
| die ganze Scheide mit Schlingen angefüllt.            | vor 12 Stunden gesprungen.                                 | Wendung auf den Fuss, sofortige Extraction, da Nabelschnurpuls langsam und schwach wird.                                                                          | K. l. a.  | —                                                   |
| eine grosse Schlinge in der Scheide.                  | vor $1\frac{1}{2}$ Stunde gesprungen.                      | spontane Geburt.                                                                                                                                                  | K. + a.   | einfach plattes Becken.                             |
| —                                                     | steht, in ihr der rechte Fuss und die rechte Hand fühlbar. | Sprengung der Blase. Bei dem Versuche, die rechte Hand und den rechten Fuss zu reponieren, fällt die Nabelschnur vor. Wendung auf den Fuss, sofortige Extraction. | K. l. a.  | —                                                   |
| eine 20 cm lange Schlinge hängt aus der Vulva heraus. | vor 1 Stunde gesprungen.                                   | vergeblicher Repositionsversuch. Wendung auf den Fuss, sofortige Extraction.                                                                                      | M. l. a.  | allgemein verengtes Becken. Nabelschnurlänge 83 cm. |

| No. | Journal-<br>No. | Alter | Wieviel<br>Gebär. | Becken                         |                                |                                |                                |       | Kindeslage                                                    | Muttermund                                   | Nabelschnur-<br>puls    |
|-----|-----------------|-------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
|     |                 |       |                   | Sp.                            | Cr.                            | Tr.                            | C. e.                          | C. d. |                                                               |                                              |                         |
| 172 | 213             | 33    | 3                 | 23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 27                             | 28                             | 18 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 9     | II. Schädellage.                                              | handtellergröss.                             | gut.                    |
| 173 | 231             | 30    | 7                 | —                              | —                              | —                              | —                              | —     | II. Schädellage.                                              | vollständig.                                 | gut.                    |
| 174 | 240             | 33    | 6                 | 22                             | 27                             | 31 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | 16 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | —     | I. Schädellage.                                               | kleinhandteller-<br>gröss.                   | langsam.                |
| 175 | 252             | 29    | 4                 | —                              | —                              | —                              | —                              | —     | I. Schädellage,<br>Kopf nach links<br>abgewichen.             | knapp hand-<br>tellergröss.                  | —                       |
| 176 | 292             | 27    | 2                 | —                              | —                              | —                              | —                              | —     | I. Schädellage.                                               | fast vollständig.                            | gut.                    |
| 177 | 328             | 25    | 2                 | 25                             | 29                             | 31                             | 17                             | —     | I. Schädellage,<br>Kopf etwas nach<br>rechts abge-<br>wichen. | kleinhandteller-<br>gröss.                   | gut.                    |
| 178 | 433             | 27    | 3                 | 21 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 26 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | —                              | 16 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | —     | I. Schädellage.                                               | vollständig.                                 | erloschen.              |
| 179 | 492             | 36    | 8                 | 23 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | 27 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | 29 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 17 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | —     | I. Schädellage.                                               | handtellergröss.                             | schwach und<br>langsam. |
| 180 | 500             | 31    | 6                 | 23 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 26 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 29                             | 15 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | —     | I. Schädellage.                                               | bis auf einen<br>schmalen Saum<br>erweitert. | gut.                    |

| Wieviel Nabelschnur vorgefallen?                                  | Blase                                                  | Therapie                                                                                                                                                                     | Kind        | Bemerkungen                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| die Scheide mit Schlingen angefüllt.                              | vor 1 $\frac{1}{2}$ Stunde gesprungen.                 | Wendung auf den Fuss, Kind bis zum Nabel spontan geboren, dann Extraction.                                                                                                   | M. l. a.    | allgemein verengtes rhachitisches Becken. Nabelschnurlänge 78 cm. |
| im Muttermunde und im oberen Teile der Scheide mehrere Schlingen. | vor 1 $\frac{1}{2}$ Stunde gesprungen.                 | Wendung auf den Fuss, sofortige Extraction.                                                                                                                                  | K. l. a.    | —                                                                 |
| ein Convolut von Schlingen in der Vagina.                         | vor 1 Stunde gesprungen.                               | Wendung auf den Fuss, Extraction.                                                                                                                                            | M. + a.     | allgemein verengtes plattes Becken.                               |
| —                                                                 | steht, hinter ihr die pulsierende Nabelschnur fühlbar. | Linke Seitenlage. Nach 2 Stunden Muttermund vollständig. Sprengung der Blase. Es fällt dabei viel Nabelschnur und eine Hand vor. Wendung auf den Fuss. Sofortige Extraction. | K. l. a.    | —                                                                 |
| die Scheide mit Nabelschnurschlingen angefüllt.                   | vor $\frac{3}{4}$ Stunde gesprungen.                   | Wendung auf den Fuss. Sofortige Extraction, weil Nabelschnur pulslos.                                                                                                        | M. l. a.    | —                                                                 |
| grosses Convolut von Schlingen in der Scheide.                    | vor 3 $\frac{1}{4}$ Stunden gesprungen.                | Wendung auf den Fuss. Da kindliche Herztöne sehr verlangsamt, sofortige Extraction.                                                                                          | M. l. a.    | rhachitisches plattes Becken.                                     |
| eine Schlinge in der Vulva sichtbar.                              | vor 1 Stunde gesprungen.                               | spontane Geburt.                                                                                                                                                             | M. + a.     | Nabelschnurlänge 75 cm.                                           |
| eine Schlinge vor der Vulva.                                      | —                                                      | Wendung auf den Fuss. Danach Nabelschnur pulslos. Spontane Geburt bis zum Rippenbogen. Als dann ad usum discipuli Extraction.                                                | M. + a.     | —                                                                 |
| —                                                                 | steht, in ihr ein Knäuel von Schlingen fühlbar.        | Zurückschieben der Nabelschnur in den Eihäuten, Einleiten des Kopfes durch Druck auf den Steiss. Als dann Sprengen der Blase. Spontane Geburt abgewartet.                    | K. l. n. a. | plattes rhachitisches Becken.                                     |

| No.                              | Journal<br>No. | Alter | Wieviel<br>Gebär. | Becken           |                  |                  |                  |       | Kindeslage                                                                                           | Muttermund               | Nabelschnur-<br>puls         |
|----------------------------------|----------------|-------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
|                                  |                |       |                   | Sp.              | Cr.              | Tr.              | C. e.            | C. d. |                                                                                                      |                          |                              |
| 181                              | 562            | 39    | 11                | 24 $\frac{1}{2}$ | 29 $\frac{1}{2}$ | 31 $\frac{1}{2}$ | 19 $\frac{1}{2}$ | —     | I. Schädellage.                                                                                      | fünfmarkstück-<br>gross. | erloschen.                   |
| I. IV.<br>1899 -31.<br>III. 1900 |                |       |                   |                  |                  |                  |                  |       |                                                                                                      |                          |                              |
| 182                              | 43             | 42    | 18                | —                | —                | —                | —                | —     | I. dorsoanteriore<br>Querlage.                                                                       | vollständig.             | schwach und<br>sehr langsam. |
| 183                              | 169            | 39    | 7                 | —                | —                | —                | —                | —     | I. Schädellage.                                                                                      | vollständig.             | erloschen.                   |
| 184                              | 196            | 25    | 3                 | —                | —                | —                | —                | —     | II. Schädellage,<br>Kopf etwas nach<br>rechts abge-<br>wichen.                                       | handtellergross.         | gut.                         |
| 185                              | 202            | 33    | 10                | —                | —                | —                | —                | —     | I. Schädellage.                                                                                      | fast vollständig.        | gut.                         |
| 186                              | 294            | 26    | 3                 | —                | —                | —                | —                | —     | II. dorsoanteriore<br>Querlage.                                                                      | fünfmarkstück-<br>gross. | erloschen.                   |
| 187                              | 391            | —     | 3                 | —                | —                | —                | —                | —     | I. dorso posteriore<br>Querlage.                                                                     | vollständig.             | gut.                         |
| 188                              | 480            | 34    | 7                 | 23               | 28               | 32               | 19 $\frac{1}{4}$ | —     | II. Schädellage.                                                                                     | vollständig.             | gut.                         |
| 189                              | 560            | 40    | 11                | —                | —                | —                | —                | —     | I. Schädellage.                                                                                      | fast vollständig.        | gut.                         |
| 190                              | 580            | 31    | 11                | —                | —                | —                | —                | —     | II. Schädellage.                                                                                     | vollständig.             | —                            |
| I. IV.<br>1900 -31.<br>III. 1901 |                |       |                   |                  |                  |                  |                  |       |                                                                                                      |                          |                              |
| 191                              | 59             | 38    | 2                 | —                | —                | —                | —                | —     | Gemelli:<br>A) I. unvollkom-<br>mene Fusslage.<br>B) II. Schädellage<br>mit Nabelschnur-<br>vorfall. | vollständig.             | —                            |

| Wieviel Nabelschnur vorgefallen?                          | Blase                                           | Therapie                                                                                                                                                   | Kind                       | Bemerkungen                           |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| eine ca. 12 cm lange Schlinge hängt aus der Vulva heraus. | vor 13 Stunden gesprungen.                      | spontane Geburt.                                                                                                                                           | M. + a.                    | —                                     |
| eine Schlinge.                                            | vor $3\frac{1}{4}$ Stunden gesprungen.          | Wendung auf den Fuss u. sofortige Extraction.                                                                                                              | M. + a.                    | Placenta praevia lateralis.           |
| eine lange Schlinge vor der Vulva.                        | vor 7 Stunden gesprungen.                       | Forceps (exercitii causa).                                                                                                                                 | K. + a.                    | Nabelschnurlänge 90 cm.               |
| eine Schlinge in der Vulva.                               | vor $4\frac{1}{2}$ Stunden gesprungen.          | Wendung auf den Fuss. Sofortige Extraction, weil Nabelschnur pulslos.                                                                                      | K. l. a.                   | rechter Arm gleichfalls vorgefallen.  |
| eine grosse Schlinge neben dem Kopfe.                     | vor $3\frac{1}{4}$ Stunden gesprungen.          | Wendung auf den Fuss. Sofortige Extraction, weil Nabelschnur pulslos.                                                                                      | K. l. a.                   | —                                     |
| Nabelschnur liegt weit vor der Vulva.                     | —                                               | Wendung durch Anziehen des Fusses. Entwicklung des Kopfes.                                                                                                 | M. + n. a.                 | rechter Fuss gleichfalls vorgefallen. |
| mehrere Schlingen in der Scheide.                         | —                                               | Wendung auf den Fuss. Sofortige Extraction, weil die kindlichen Herztöne nicht mehr zu hören sind.                                                         | K. + a.                    | linker Fuss gleichfalls vorgefallen.  |
| ein grosses Convolut von Schlingen.                       | vor $1\frac{1}{2}$ Stunde gesprungen.           | Wendung auf den Fuss. Nach Geburt des Steisses Extraction.                                                                                                 | K. l. a.                   | —                                     |
| —                                                         | steht, in ihr eine Nabelschnurschlinge fühlbar. | Sprengung der Blase. Sofort fällt eine grosse Nabelschnurschlinge vor, und der Kopf tritt ins Becken. Forceps.                                             | K. l. a.                   | —                                     |
| eine Schlinge in der Scheide.                             | vor 2 Stunden gesprungen.                       | Wendung auf den Fuss. Sofortige Extraction, weil Nabelschnurpuls kaum noch zu fühlen.                                                                      | K. l. a.                   | —                                     |
| —                                                         | Blase des zweiten Zwillings steht.              | Sprengung der Blase. Dabei fällt eine vorher nicht fühlbare Nabelschnurschlinge vor. Wendung auf den Fuss. Sofortige Extraction, weil Nabelschnur pulslos. | A) K. l. a.<br>B) K. l. a. | —                                     |

| No. | Journal-<br>No. | Alter | Wieviel<br>Gebär. | Becken                         |     |     |       |                                | Kindeslage                                  | Muttermund                 | Nabelschnur-<br>puls    |
|-----|-----------------|-------|-------------------|--------------------------------|-----|-----|-------|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
|     |                 |       |                   | Sp.                            | Cr. | Tr. | C. e. | C. d.                          |                                             |                            |                         |
| 192 | 211             | 20    | 1                 | —                              | —   | —   | —     | 10                             | II. Schädellage.                            | vollständig.               | —                       |
| 193 | 268             | 41    | 9                 | —                              | —   | —   | —     | —                              | II. Schädellage.                            | fast vollständig.          | gut.                    |
| 194 | 332             | 33    | 5                 | —                              | —   | —   | —     | —                              | II. Schädellage.                            | vollständig.               | erloschen.              |
| 195 | 400             | 35    | 8                 | —                              | —   | —   | —     | —                              | II. Schädellage<br>(Vorderhaupts-<br>lage). | vollständig.               | sehr schwach.           |
| 196 | 434             | 42    | 10                | —                              | —   | —   | —     | —                              | I. vollkommene<br>Fusslage                  | vollständig.               | schwach und<br>langsam. |
| 197 | 441             | 31    | 2                 | 22                             | 26  | 29  | 18    | 10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | I. Schädellage.                             | fast vollständig.          | schwach.                |
| 198 | 521             | 22    | 3                 | —                              | —   | —   | —     | —                              | I. Schädellage.                             | vollständig.               | erloschen.              |
| 199 | 535             | 32    | 6                 | 24 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 29  | 32  | 19    | —                              | II. Schädellage.                            | fünfmarkstück-<br>gross.   | erloschen.              |
| 200 | 542             | 36    | 7                 | —                              | —   | —   | —     | —                              | I. Schief-<br>lage.                         | kleinhandteller-<br>gross. | gut.                    |

| Wieviel Nabelschnur vorgefallen?                | Blase                                                                            | Therapie                                                                                                                                                                                 | Kind     | Bemerkungen                                                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|
| —                                               | steht, in ihr ein Convolut von schwach pulsirender Nabelschnurschlingen fühlbar. | Sprengung der Blase. Wendung auf den Fuss. Sofortige Extraction. Schwierige Armlösung.                                                                                                   | K. 1. a. | enges Becken.                                                    |
| eine ca. 25 cm lange Schlinge vor dem Kopfe.    | vor 1 Stunde gesprungen.                                                         | Wendung auf den Fuss. Sofortige Extraction, da die kindlichen Herztöne dauernd unter 100 bleiben.                                                                                        | K. 1. a. | —                                                                |
| eine grosse Schlinge.                           | vor $1\frac{1}{4}$ Stunden gesprungen.                                           | spontane Geburt.                                                                                                                                                                         | M. + a.  | —                                                                |
| eine circa 20 cm lange Schlinge vor der Vulva.  | vor 5 Stunden gesprungen.                                                        | Wendung auf den Fuss. sofortige Extraction.                                                                                                                                              | M. + a.  | —                                                                |
| zwischen beiden Füßen die Nabelschnur fühlbar.  | —                                                                                | Strecken der Beine. Da sich der Nabelschnurpuls nicht wieder erholt, Extraction angeschlossen.                                                                                           | M. 1. a. | —                                                                |
| eine circa 20 cm lange Schlinge in der Scheide. | vor $11\frac{1}{2}$ Stunden gesprungen.                                          | Wendung auf den Fuss. Da Nabelschnurpuls sehr schwach, sofortige Extraction. Veit-Smellie bringt den Kopf trotz energischen Zuges und Druck von aussen nicht in das Becken. Perforation. | K. + a.  | allgemein verengtes Becken. Rechter Arm gleichfalls vorgefallen. |
| eine grosse Schlinge.                           | kurz zuvor gesprungen.                                                           | spontane Geburt.                                                                                                                                                                         | M. + a.  | —                                                                |
| eine circa 30 cm lange Schlinge vor der Vulva.  | vor $11\frac{1}{2}$ Stunden gesprungen.                                          | Rechte Seitenlage. Nach 2 Stunden Muttermund nahezu erweitert. Exercitis causa, Perforation, Kranio-klasie.                                                                              | K. + a.  | —                                                                |
| einige Schlingen rechts neben dem Kopfe.        | vor $21\frac{1}{2}$ Stunden gesprungen.                                          | Reposition unter gleichzeitigem Vorschieben des Kopfes von aussen her. Lagerung der Kreissenden auf die linke Seite. Spontane Geburt.                                                    | M. 1. a. | —                                                                |

## Litteratur.

---

- W. Bail: Über Nabelschnurvorfälle; Dissertation, Greifswald 1899.
- E. Bumm: Grundriss zum Studium der Geburtshülfe. 1. Aufl. 1902.
- H. Fritsch: Klinik der geburtshülflichen Operationen. 4. Aufl. 1888.
- P. Müller: Handbuch der Geburtshülfe.
- Schrader: Die Therapie bei prolapsus funiculi umbilicalis; Dissertation, Berlin 1890.
- Smoliboeki: Klinische Beobachtungen über Dislokation der Nabelschnur; Dissertation, Breslau 1898.
- F. v. Winckel: Lehrbuch der Geburtshülfe. 2. Aufl. 1893.
- Olshausen und Veit: Lehrbuch der Geburtshülfe. Auf Grundlage des Lehrbuches von Karl Schroeder und zugleich als 13. Auflage desselben. 1899.
- Zacharias: Über Nabelschnurumschlingungen und Nabelschnurvorfälle; Dissertation, Königsberg 1890.
-

## Vita.

---

Am 17. August 1875 wurde ich, Max Willy Wolfgang Köhler, evangelischer Konfession, zu Halle a. S. geboren, wo mein Vater Professor der Pharmakologie an der vereinigten Friedrichs-Universität war. Meine Schulbildung genoss ich auf dem Stadtgymnasium meiner Vaterstadt, welches ich Michaelis 1896 mit dem Reifezeugnis verliess. Dem Studium der Medizin widmete ich mich ununterbrochen auf der Universität Halle-Wittenberg und bestand am Schlusse des vierten Semesters die ärztliche Vorprüfung. Der ärztlichen Staatsprüfung unterzog ich mich ebenfalls in Halle im Sommersemester 1901, meinem zehnten Studiensemester. Die Approbation als Arzt erhielt ich am 9. November 1901.

Während meiner Studienzeit hörte ich die Vorlesungen folgender Herren Professoren und Dozenten:

Bernstein, v. Bramann, Dorn, Eberth, Eisler, Endres †, Fehling, Fränkel, Grenacher, Grunert, Haasler, Harnack, Heilbronner, v. Herff, v. Hippel, Hitzig, Kraus, Kromayer, v. Mering, Nebelthau, Oberst, Pott, Reineboth †, Roux, Vollhard, Weber.

Allen diesen meinen hochverehrten Lehrern spreche ich an dieser Stelle meinen ehrerbietigsten Dank aus.

---

